

• **Interferência em exames laboratoriais:** Não são conhecidas interferências em exames laboratoriais com o uso de **Ad-Muc®**.

☹️ **Reações adversas:** *Foram relatados raros casos de reações de hipersensibilidade.*

📖 **Posologia:**

Lavar e secar as mãos antes do manuseio do produto. Aplicar **Ad-Muc®** duas vezes ao dia, por exemplo, pela manhã e à noite, após escovar os dentes ou após as refeições. Depois do desaparecimento dos sintomas, recomenda-se continuar com a aplicação de **Ad-Muc®** uma vez ao dia, por algum tempo. Aplicar **Ad-Muc®** na gengiva com a ponta do dedo seco (utilizar o dedo indicador para as regiões externas da gengiva e o dedo polegar para as regiões internas) e massagear com a mesma as mucosas. A gengiva deve ser massageada em movimentos circulares, dirigidos para a coroa do dente. Em caso de salivação aumentada, deve-se secar a gengiva antes da massagem.

🚫 **Superdosagem:**

Não são conhecidos casos de superdosagem com o uso de **Ad-Muc®**.

• **Pacientes idosos:** Veja o item "geriatria" em "Precauções e advertências".

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica.



Registro MS – 1.0974.0172
Farm. Resp.: Dr. Dante Alario Junior
CRF-SP nº 5143

Número do lote, data da fabricação e prazo de validade: vide cartucho/rótulo.

BiOLAB

Fabricado e distribuído sob licença de
Merz Pharmaceuticals GmbH,
Frankfurt/Alemanha por:
BIOLAB SANUS Farmacêutica Ltda.
Av. Paulo Ayres, 280 - Taboão da Serra - SP
CEP 06767-220 SAC 0800 11 1559
CNPJ 49.475.833/0001-06
Indústria Brasileira

Corte: 240 x 150 mm

EE 024060 C1



Ad-Muc®
Extrato fluido de
Chamomilla recutita (L.) Rauschert

FITOTERÁPICO



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

• **Forma farmacêutica e apresentação:**
Pomada. Bisnaga com 10 g.

• **USO ADULTO OU PEDIÁTRICO (crianças maiores de 3 anos).**

• **Composição:**

Pomada

Cada g da pomada contém:

Extrato fluido de

Chamomilla recutita (L.) Rauschert 100 mg

Excipientes: glicerol, álcoois de lanolina, álcool cetosteárilico, vaselina branca, petrolato sólido, goma xantana, metilparabeno, essência de menta, tintura de mirra, óleo mineral, sacarina sódica, água purificada.



INFORMAÇÕES AO PACIENTE

• **Ad-Muc®** possui ação antiinflamatória e antibacteriana e auxilia no processo de cicatrização de feridas na mucosa bucal.

• Mantenha **Ad-Muc®** em temperatura ambiente (15 a 30°C).

• **Prazo de validade:** 24 meses a partir da data de fabricação. Não utilize medicamentos com a validade vencida.

• Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob prescrição médica ou do cirurgião-dentista. Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento com **Ad-Muc**[®] ou após o seu término. Informe ao médico se está amamentando. **Ad-Muc**[®] não deve ser utilizado por mães que estejam amamentando.

• Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento com **Ad-Muc**[®]. Lave e seque as mãos antes de aplicar o produto.

• Não interrompa o tratamento com **Ad-Muc**[®] sem o conhecimento do seu médico. A doença e/ou seus sintomas poderão retornar.

• Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis. Se ocorrerem sintomas como sensação de inquietude, agitação, vermelhidão na face, palpitações, coceira, pulsação no ouvido, tosse, espirro, dificuldade de respirar, entre 1 e 15 minutos da administração do medicamento, é necessário procurar auxílio médico com urgência.

• **TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

• Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento com **Ad-Muc**[®].

• **Contra-indicações:** **Ad-Muc**[®] não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula e aos parabenos (conservantes).

• **NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE.**



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

• **Características:** **Ad-Muc**[®] contém um extrato fluido de Camomila, que possui reconhecidas propriedades anti-séptica e antiinflamatória.

Nomenclatura oficial: *Chamomilla recutita* (L.) Rauschert

Família: Asteraceae (Compositae).

Partes usadas: Flores.

Título: Padronizado em mínimo de 0,3% de óleos essenciais.

Principais constituintes: Óleo essencial (α -bisabolol, bisabolol óxido A e B, camazuleno); matricina; derivados flavonóides (apigenina, apigenina-7-glicosídeo, quercetina, luteolina,); coumarinas (herniarina e umbelliferona); ácidos carboxílicos fenólicos (ácidos caféicos, anísico, vanílico); mucilagem.

A *Chamomilla recutita* (L.) Rauschert possui diversas substâncias antiinflamatórias, tais como o camazuleno, o α -bisabolol e a matricina, que auxiliam no processo de cicatrização de pequenas feridas na mucosa bucal. O camazuleno exerce seu efeito antiinflamatório através da inibição da formação do leucotrieno B₄ e do bloqueio da peroxidação química do ácido aracônico. O α -bisabolol promove a granulação e regeneração tecidual. Os polissacarídeos possuem atividade imunoestimulante. O efeito antibacteriano foi demonstrado com o uso do óleo essencial.

As informações farmacológicas existentes sobre o extrato de Camomila, somadas à história de seu uso tradicional, indicam que **Ad-Muc**[®] pode ser utilizado

com segurança e de maneira eficaz nas aplicações indicadas.

☞ **Indicações:** **Ad-Muc**[®] é indicado para o tratamento das gengivas e da mucosa oral (nos casos de gengivite, estomatite e outras inflamações da cavidade bucal; irritações bucais originadas de dentaduras mal ajustadas).

Ⓟ **Contra-indicações:** **Ad-Muc**[®] não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula, aos parabenos, e às plantas da família *Compositae*; lactantes e crianças menores de 3 anos de idade.

ⓘ **Precauções e advertências:**

Gravidez – Até o momento, não foram relatados efeitos adversos com o uso de **Ad-Muc**[®] em mulheres grávidas.

Entretanto, recomenda-se evitar o uso excessivo durante o período de gestação. Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob prescrição médica ou do cirurgião-dentista.

Lactação – **Ad-Muc**[®] não deve ser utilizado por mães que estejam amamentando.

Pediatria – **Ad-Muc**[®] não deve ser usado por crianças menores de 3 anos de idade.

Geriatrics (idosos) – Não há restrições específicas para o uso de **Ad-Muc**[®] em pacientes idosos.

Ⓜ **Interações medicamentosas:** Não são conhecidas interações medicamentosas com o uso de **Ad-Muc**[®].