

ATENÇÃO DIABÉTICOS: CONTÉM AÇÚCAR.

Interações medicamentosas

Preparações contendo cloridrato de difenidramina não devem ser administradas a pacientes recebendo IMAO.

Reações adversas

São raras e podem constar de: náuseas, vômitos, irritação gástrica e sonolência.

Posologia

Adultos ou crianças acima de 12 anos

Usar Alergo Filinal® (cloridrato de difenidramina + cloridrato de piridoxina + guanifenesina + aminofilina) expectorante Adulto na dose de:

10 ml (1 colher de sobremesa), via oral, de 4 em 4 horas.

Crianças

Usar Alergo Filinal® (cloridrato de difenidramina + cloridrato de piridoxina + guanifenesina + aminofilina) expectorante pediátrico na dose de:

1 a 2 anos – 5 ml (1 colher das de chá), via oral, 2 a 4 vezes ao dia.
2 a 6 anos – 5 ml (1 colher das de chá), via oral, 4 a 6 vezes ao dia.
6 a 12 anos – 10 ml (1 colher de sobremesa), via oral, 3 a 5 vezes ao dia.

Pacientes Idosos

Devem-se seguir as orientações gerais descritas anteriormente.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

N.º de lote, data de fabricação e prazo de validade: Vide cartucho.

Para sua segurança mantenha esta embalagem até o uso total do medicamento.

MS - 1.0043.0886

Farm. Resp.: Dra. Sônia Albano Badaró
CRF-SP 19.258



Aergo Filinal®

cloridrato de difenidramina +
cloridrato de piridoxina +
guanifenesina +
aminofilina

Xarope

FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES

Apresentação

Aergo Filinal® Xarope Expectorante Pediátrico – Frasco com 50 mL.

Aergo Filinal® Xarope Expectorante Adulto – Frasco com 120 mL.

USO PEDIÁTRICO OU ADULTO

Composição

Cada colher das de chá (5ml) contém:

Pediátrico

cloridrato de difenidramina	12,5 mg
cloridrato de piridoxina (Vitamina B 6)	0,6 mg
guanifenesina	60,0 mg
aminofilina	29,1 mg
Excipientes - açúcar refinado, álcool etílico, meliparabeno, propilparabeno, vanilina, sacarina sódica, óleo de limão, trietanolamina, solução hidroalcoólica de casca de laranja, solução hidroalcoólica de casca de tangerina, água deionizada q.s.p.	

Adulto

cloridrato de difenidramina	12,5 mg
cloridrato de piridoxina (Vitamina B 6)	1,0 mg
guanifenesina	100,0 mg
aminofilina	35,0 mg
Excipientes - açúcar refinado, álcool etílico, aroma framboesa, meliparabeno, propilparabeno, vanilina, sacarina sódica, trietanolamina, solução hidroalcoólica de casca de laranja amarga, água deionizada q.s.p.	

INFORMAÇÃO AO PACIENTE

Ação esperada do medicamento

Nas traqueo-brônquites agudas e crônicas e no estado asmático crônico, o tratamento auxiliar visa a melhora da capacidade ventilatória dos



EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA.

Av. Ver. José Diniz, 3.465

São Paulo – SP

CNPJ: 01.190.096/000-192

Indústria Brasileira



Eurofarma

0800-704-3876

eurolote@eurofarma.com.br

www.eurofarma.com.br

208449-00 (A) - L. 83
(11/06)

pulmões, diminuição da congestão brônquica e expectoração ativa sem irritação.

Alergo Filinal® (cloridrato de difenidramina + cloridrato de piridoxina + guaifenesina + aminofilina) expectorante, através da ação combinada de seus componentes, preenche estes requisitos.

Cuidados de armazenamento

Proteger da luz, umidade e evitar calor excessivo (temperatura superior a 40°C).

Prazo de validade

Desde que sejam observados os cuidados de armazenamento o produto apresenta prazo de validade de 24 meses, contados a partir da data de fabricação impressa em sua embalagem externa. O produto não deve ser utilizado fora do prazo de validade indicado sob o risco de não produzir os efeitos esperados.

NÃO USE MEDICAMENTOS COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO.

Gravidez e Lactação

Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando.

O uso de qualquer medicamento por mulheres durante a gravidez requer a avaliação de seus benefícios, bem como dos riscos que possam acarretar à mãe e ao feto.

Cuidados de administração

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Interrupção do tratamento

Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Reações adversas

São raras e podem constar de náuseas, vômitos, irritação gástrica e sonolência.

Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Contra-indicações e precauções

Hipersensibilidade aos componentes da formulação, crise asmática, glaucoma de ângulo estreito, hipertrofia prostática, obstrução piloroduodenal, úlcera péptica ativa. Preparações contendo cloridrato

de difenidramina não devem ser administradas a pacientes recebendo IMAO.

Use com cautela na presença de doenças cardiovasculares. Alergo Filinal® (cloridrato de difenidramina + cloridrato de piridoxina + guaifenesina + aminofilina) expectorante deve ser usado com cuidado em pacientes com medicação hipnótica ou sedativa, devido ao possível efeito extrapiramidal. Indivíduos, quando em uso de Alergo Filinal® (cloridrato de difenidramina + cloridrato de piridoxina + guaifenesina + aminofilina), não devem conduzir veículos ou operar máquinas perigosas. Deve-se lembrar da possibilidade, se bem que rara, de ocorrência de reação paradoxal comum a qualquer substância anti-histamínica, o que determina ao paciente um aumento de sua tensão emocional e nervosismo. Algumas crianças podem ser sensíveis à aminofilina. Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

ATENÇÃO DIABÉTICOS: CONTEM AÇÚCAR.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Indicações

No tratamento das traqueo-bronquites alérgicas agudas e crônicas e bronquite asmática crônica.

Contra-Indicações

Hipersensibilidade aos componentes da formulação, crise asmática, glaucoma de ângulo estreito, hipertrofia prostática, obstrução piloroduodenal, úlcera péptica ativa. Preparações contendo cloridrato de difenidramina não devem ser administradas a pacientes recebendo IMAO.

Precauções

Use com cautela na presença de doenças cardiovasculares. Alergo Filinal® (cloridrato de difenidramina + cloridrato de piridoxina + guaifenesina + aminofilina) expectorante deve ser usado com cuidado em pacientes com medicação hipnótica ou sedativa, devido ao possível efeito extrapiramidal. Indivíduos, quando em uso de Alergo Filinal® (cloridrato de difenidramina + cloridrato de piridoxina + guaifenesina + aminofilina), não devem conduzir veículos ou operar máquinas perigosas. Deve-se lembrar da possibilidade, se bem que rara, de ocorrência de reação paradoxal comum a qualquer substância anti-histamínica, o que determina ao paciente um aumento de sua tensão emocional e nervosismo. Algumas crianças podem ser sensíveis à aminofilina.