

Finigas®

dimeticona



FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES

Comprimidos contendo 40 mg de dimeticona em blister com 20 comprimidos.
Suspensão oral: gotas contendo 75 mg/ml de dimeticona em frasco-plástico opaco gotejador com 10 ml, em caixas com 1 frasco e em caixas com 25 frascos.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Comprimido

Cada comprimido contém:

Dimeticona..... 40 mg
Excipientes* q.s.p. 1 comprimido
*Excipientes: Fosfato de cálcio dibásico, croscarmelose sódica, lactose, polividona, amido de milho, celulose microcristalina, dióxido de silício.

Suspensão oral-gotas

Cada ml da suspensão oral contém:

Dimeticona 75 mg
Veículo* q.s.p. 1 ml
*Veículo: Sacarina sódica, metilparabeno, corante vermelho ponceau, essência de framboesa, hidroxietilcelulose, água deionizada.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Ação esperada do medicamento: FINIGAS® age sobre os gases gastrointestinais, facilitando a sua eliminação e reduzindo a distensão abdominal, principalmente no pós-operatório.

Cuidados de armazenamento: Os comprimidos devem ser armazenados em temperatura ambiente (15 a 30°C) e ao abrigo da umidade. A suspensão oral deve ser armazenada em temperatura ambiente (15 a 30°C).

Prazo de validade: Não utilize medicamento com a validade vencida. O prazo de validade de FINIGAS® está impresso na embalagem, sendo os comprimidos 36 meses e a suspensão oral 24 meses após a data de fabricação.

Gravidez e lactação: Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando. FINIGAS® não deve ser usado em bebês que estejam sob amamentação.

Interrupção do tratamento: Não interromper o tratamento sem o conhecimento de seu médico.

Reações adversas: Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Contra-indicações e precauções: Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.

Não deve ser usado durante a lactação.

Durante o tratamento, visite regularmente seu médico e realize os exames complementares solicitados.

Riscos da auto-medicação:

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO; PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

A dimeticona é um agente repelente de água, que altera a tensão superficial das bolhas de gás e favorece a sua coalescência, formando grandes bolhas que se rompem com

o súbito aumento da pressão intragástrica ou intestinal e, assim, facilitando a eliminação dos gases.

A eliminação é fecal como fármaco inalterado.

INDICAÇÕES

Nos casos de aerofagia, distensão abdominal pós-operatória e flatulência. Pode ser utilizado como adjuvante na gastroscopia e radiografia intestinal.

CONTRA-INDICAÇÕES

Hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

PRECAUÇÕES

Não utilizar para o tratamento de cólicas em lactentes.

Não se descreveu problemas quanto à utilização em humanos.

REAÇÕES ADVERSAS

Ainda não são conhecidas a intensidade e a frequência das reações adversas.

POSOLOGIA

Adultos: 1 a 2 comprimidos, três vezes ao dia, ou, 16 gotas, três vezes ao dia, após as refeições e ao deitar.

Crianças:

Lactentes: 4 a 6 gotas três vezes ao dia.

Até 12 anos: 6 a 12 gotas três vezes ao dia.

Acima de 12 anos: 16 gotas três vezes ao dia.

Agitar bem a suspensão oral antes do uso.

Dose máxima diária:

Adultos - 500 mg/dia.

Crianças - doses individualizadas pelo médico.

PACIENTES IDOSOS

As doses e cuidados para pacientes idosos são as mesmas recomendadas para os adultos.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

Nº do Lote; Data de Fabricação e Validade: vide Cartucho.

MS - 1.0118.0044

Farmacêutico Responsável:

Dr. Eduardo Sérgio Medeiros Magliano

CRF-SP nº 7179

19506/01

22006/01

XII-07



APSEN FARMACÊUTICA S/A
Rua La Paz, nº 37/67 - Santo Amaro
CEP 04755-020 - São Paulo - SP
CNPJ 62.462.015/0001-29
Indústria Brasileira

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
 **0800 16 5678**
LIGAÇÃO GRATUITA
infomed@apsen.com.br
www.apsen.com.br