

Magnésia Bisurada®

carbonato de magnésio
carbonato de bismuto
carbonato de cálcio
bicarbonato de sódio

Nome Comercial: Magnésia Bisurada®

Nome Genérico: carbonato de magnésio, carbonato de bismuto, carbonato de cálcio e bicarbonato de sódio.

Pastilha Antiácida

Forma farmacêutica e apresentações referentes a esta bula:

Magnésia Bisurada®: caixas com 40 e 200 pastilhas.

Uso oral

USO ADULTO

Leia sempre a bula. Ela traz informações importantes e atualizadas sobre este medicamento.

Composição

Cada pastilha contém:

carbonato de magnésio	67,00 mg
carbonato de bismuto	3,30 mg
carbonato de cálcio	521,00 mg
bicarbonato de sódio.....	63,70 mg

Excipientes: sacarina sódica, açúcar granulado, amido de milho, estearato de magnésio, óleo de menta e anetol.

Informações ao paciente

Como este medicamento funciona?

Magnésia Bisurada® é um antiácido que tem como função principal neutralizar o excesso de ácido produzido pelo estômago. Desta forma, Magnésia Bisurada® diminui a acidez estomacal, promovendo alívio imediato dos sintomas como azia, queimação e dor de estômago.

Por que este medicamento foi indicado?

Magnésia Bisurada® está indicada para o alívio dos sintomas como azia, queimação e dor estomacal.

Quando não devo usar este medicamento?

Magnésia Bisurada® não deve ser utilizada por pessoas com hipersensibilidade aos componentes da fórmula, na presença de hipercalcemia e distúrbios renais graves.

ATENÇÃO: ESTE MEDICAMENTO CONTÉM AÇÚCAR, PORTANTO, DEVE SER USADO COM CAUTELA EM PORTADORES DE DIABETES.

ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MULHERES GRÁVIDAS SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA.

ESTE MEDICAMENTO É CONTRA-INDICADO NA FAIXA ETÁRIA DE MENORES DE 12 ANOS DE IDADE.

INFORME AO MÉDICO O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS. INFORME AO SEU MÉDICO SE VOCÊ ESTÁ FAZENDO USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO.

Como devo usar este medicamento?

Dissolver na boca ou mastigar 1 ou 2 pastilhas, conforme necessidade. Não é preciso água. Repetir a cada hora se os sintomas persistirem ou conforme indicação médica. Não ultrapassar a dose máxima de 10 pastilhas ao dia.

Não utilizar as dosagens máximas sugeridas por um período superior a duas semanas, a não ser sob orientação médica. Não repetir a administração em intervalos menores que uma hora.

Magnésia Bisurada® pode alterar a absorção de outros fármacos, por isso recomenda-se manter um intervalo de 1 a 2 horas entre a tomada da Magnésia Bisurada® e a do outro medicamento.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA. NÃO USE O MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ANTES DE USAR OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO.

Quais os males que este medicamento pode causar?

Nas doses habituais, não foram observadas reações adversas importantes. Ocasionalmente, pode ocorrer constipação intestinal ou diarreia, cólica abdominal e flatulência. Informe a seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

O que fazer se alguém usar uma grande quantidade deste medicamento de uma só vez?

Procure imediatamente orientação de um médico ou um centro de intoxicação.

Onde e como devo guardar este medicamento?

O produto deve ser mantido em sua embalagem original, em local protegido de umidade e da luz, em temperatura ambiente (entre 15 - 30°C).

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Informações técnicas aos profissionais de saúde

Características farmacológicas

Magnésia Bisurada® é um antiácido que tem como função principal neutralizar o excesso de ácido produzido pelo estômago, não apresentando efeito direto sobre a sua produção. Desta forma, Magnésia Bisurada® eleva o pH gástrico e duodenal, promovendo alívio imediato dos sintomas dispépticos como azia, queimação e dor de estômago. A combinação do carbonato de magnésio, carbonato de bismuto, carbonato de cálcio e bicarbonato de sódio proporciona uma rápida e prolongada sensação de alívio da sintomatologia de queimação.

Resultados de eficácia

Magnésia Bisurada® promove a neutralização do ácido clorídrico já produzido pelas células da mucosa gástrica, proporcionando alívio imediato da azia, queimação e dor estomacal. O refrescante sabor menta facilita a aceitação e aderência ao tratamento.

Indicações

Magnésia Bisurada® está indicada para o alívio sintomático da azia, queimação e dor estomacal causadas pela hiperacidez gástrica associada à gastrite, úlcera péptica, esofagite e hérnia de hiato.

Contra-indicações

Magnésia Bisurada® não deve ser utilizada por pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula, na presença de hipercalcemia e distúrbios renais graves.

Este medicamento é contra-indicado na faixa etária de menores de 12 anos de idade.

Modo de usar e cuidados de conservação depois de aberto

Dissolver na boca ou mastigar 1 ou 2 pastilhas, conforme necessidade. Não é preciso água.

Posologia

Dissolver na boca ou mastigar 1 ou 2 pastilhas, conforme necessidade. Repetir a cada hora se os sintomas persistirem ou conforme indicação médica. Não ultrapassar a dose máxima de 10 pastilhas ao dia.

Advertências

Deve-se levar em consideração a relação risco-benefício antes de iniciar o tratamento para pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, comprometimento renal, cirrose hepática, hipertensão arterial, pacientes em uso de corticosteróides e gestantes ou lactantes.

ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MULHERES GRÁVIDAS SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA.

ATENÇÃO: ESTE MEDICAMENTO CONTÉM AÇÚCAR, PORTANTO, DEVE SER USADO COM CAUTELA EM PORTADORES DE DIABETES.

Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco

Não há relatos de intercorrências até o momento sobre o uso do produto por idosos.

Interações medicamentosas

Magnésia Bisurada® pode alterar a absorção de outros fármacos, por isso recomenda-se manter um intervalo de 1 a 2 horas entre a tomada da Magnésia Bisurada® e a do outro medicamento.

Reações adversas a medicamentos

Nas doses habituais, não foram observadas reações adversas importantes. Ocasionalmente, pode ocorrer constipação intestinal ou diarreia, cólica abdominal e flatulência.

Superdose

Em casos de ingestão acidental de doses muito acima das preconizadas, recomenda-se adotar medidas habituais de controle das funções vitais.

Armazenagem

O produto deve ser mantido em sua embalagem original, em local protegido de umidade e da luz, em temperatura ambiente (entre 15 - 30°C).

MS nº 1.2110.0057

Farm. Resp.: Edina S. M. Nakamura - CRF-SP nº 9258

Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda.

Rodovia Castelo Branco, km 32,5

Itapevi - São Paulo - Brasil

CNPJ nº 61.072.393/0039-06 - Indústria Brasileira

E1486-1

03.07

Central de Relacionamento Wyeth

0800 175934

sacwh@wyeth.com

Wyeth