

Blefarite por *Demodex folliculorum*

1. Gel com Permetrina

Permetrina	5 %
Gel qsp	3,5 g

Modo de Usar: aplicar nas bordas palpebrais uma vez por semana, com um cotonete.

Ref.: 1. Junk AKet al. Topical administration of metronidazole gel as an effective therapy alternative in chronic Demodex blepharitis—a case report. Klin Monatsbl Augenheilkd. 1998 Jul;213(1):48-50. 2. Belén Padilla Ortega. Patología infecciosa em atención primaria. Aula Acreditada - El Médico Interactivo nº 801/802 octubre 2001. In <http://www.medynet.com/elmedico/aula2001/tema11/patologia7.htm>. Acesso em 19 de setembro de 2008.

2. Gel com Metronidazol

Metronidazol	2 %
Gel qsp	3,5 g

Modo de Usar: aplicar à noite nas bordas palpebrais, com massagem.

Blefarite Seborréica

Xampu com Dehyton

Dehyton	1,5 %
Sulfato de Zinco	0,005 %
Piridoxina	0,02 %
Xampu qsp	50 ml

Xampu com Miranol

Miranol	1,5 %
Sulfato de Zinco	0,005 %
Piridoxina	0,02 %
Xampu qsp	50 ml

Indicações: xampus neutros, com ação antimicrobiana, para limpeza das pálpebras nas blefarites.

Modo de Usar: limpar a região afetada com cotonete 1 vez ao dia ou sempre que necessário.

Obs.: Dehyton é um tensoativo anfótero derivado da betaina, com atividade antimicrobiana. Tem alta compatibilidade com a pele e as mucosas. Miranol é um tensoativo anfótero, com a ação detergente dos tensoativos aniónicos e a ação desinfetante dos catiônicos. Esta característica anfotérica confere ao produto baixa irritabilidade para os olhos.