

## DERMATOZOONOSES

Uso Tópico:

<b>DELTA-METRINA LOÇÃO</b>	Deltametrina ... 20mg Loção Hidroalcoólica ..... ..... q.s.p.100ml	<b>Indicação:</b> No tratamento e na profilaxia da Pediculose, Fitiríase, Escabiose e das infestações por carrapatos em geral. <b>Ação:</b> Escabicida e pediculicida.	<b>Uso:</b> A critério médico.
----------------------------	---	---	-----------------------------------

A **Deltametrina** é a substância mais ativa da classe dos piretróides. Obtida por esterificação do Ácido Crisântêmico - extraído da flor do crisântemo - apresenta elevado coeficiente de segurança e baixa toxicidade para os mamíferos. Uma vez no interior do organismo do inseto, a **Deltametrina**, transportada pela hemolinfa, fixa-se nos gânglios nervosos periféricos e nas estruturas motoras do SNC, produzindo excitabilidade, incoordenação motora, paralisia, letargia e morte do parasita.

No caso de uso em pele lesada por feridas ou queimaduras, pode ocorrer maior absorção da **Deltametrina** com efeitos gastrointestinais e neurológicos agudos. Podem ocorrer irritação cutânea, ocular e reações de hipersensibilidade, sobretudo do tipo alergia respiratória. No caso de contato acidental com os olhos, lavá-los imediatamente com água corrente por alguns minutos.

<b>DELTA-METRINA CREME</b>	Deltametrina ... 20mg Creme base ..... ..... q.s.p.100g	<b>Indicação:</b> No tratamento e na profilaxia da Pediculose, Fitiríase, Escabiose e das infestações por carrapatos em geral. <b>Ação:</b> Escabicida e pediculicida.	<b>Uso:</b> A critério médico.
----------------------------	---	---	-----------------------------------

<b>DELTA-METRINA SHAMPOO</b>	Deltametrina ... 20mg Shampoo base ..... ..... q.s.p.100g	<b>Indicação:</b> No tratamento e na profilaxia da Pediculose, Fitiríase, Escabiose e das infestações por carrapatos em geral. <b>Ação:</b> Escabicida e pediculicida.	<b>Uso:</b> A critério médico.
------------------------------	---	---	-----------------------------------

Vide seções de **ANTIINFLAMATÓRIOS, ANTIEXSUDATIVOS E ANTIPRURIGINOSOS; ANTISSÉPTICOS E CICATRIZANTES e ANTIBIÓTICOS.**

<b>EMULSÃO LINDANE</b>	Lindane ..... 1% Emulsão Lanette ..... ..... q.s.p.100ml	<b>Indicação:</b> Escabiose e Pediculose. <b>Ação:</b> Parasiticida.	<b>Uso:</b> A critério médico.
----------------------------	--	--	--------------------------------------

O *Lindane*, também conhecido como Gamexane ou Gamabenzeno, tem acentuada ação escabícida e pediculícida. É irritante tóxico, devendo ser evitado o contato com as mucosas em geral.

<b>LOÇÃO LINDANE</b>	Lindane ..... 1% Loção Hidroalcoólica ..... q.s.p.100ml	<b>Indicação:</b> Escabiose e Pediculose. <b>Ação:</b> Parasiticida.	<b>Uso:</b> A critério médico.
--------------------------	---	--	--------------------------------------

<b>CREME LINDANE</b>	Lindane ..... 1% Creme base ..... ..... q.s.p.100g	<b>Indicação:</b> Escabiose e Pediculose. <b>Ação:</b> Parasiticida.	<b>Uso:</b> A critério médico.
--------------------------	--	--	--------------------------------------

<b>SHAMPOO LINDANE</b>	Lindane ..... 1% Shampoo base ..... ..... q.s.p.100ml	<b>Indicação:</b> Escabiose e Pediculose. <b>Ação:</b> Parasiticida.	<b>Uso:</b> A critério médico.
----------------------------	---	--	--------------------------------------

<b>BENZOATO DE BENZILA EMULSÃO</b>	Benzoato de Benzila ..... 25 - 30% Emulsão O/A ..... ..... q.s.p.100ml	<b>Indicação:</b> Escabiose e Pediculose. <b>Ação:</b> Acaricida.	<b>Uso:</b> A critério médico.
--	---	---	--------------------------------------

O *Benzoato de Benzila* é um líquido oleoso e aromático com ação acaricida, usado no tratamento da Escabiose a 25% e Pediculose de 25 a 30%. É irritante, devendo portanto ser evitado o contato com as mucosas.

<b>BENZOATO DE BENZILA SOLUÇÃO HIDRO- ALCOÓLICA</b>	Benzoato de Benzila ..... 25 - 30% Solução Hidroalcoólica ..... q.s.p.100ml	<b>Indicação:</b> Escabiose e Pediculose. <b>Ação:</b> Acaricida.	<b>Uso:</b> A critério médico.
---	--	---	--------------------------------------

**Vide seções de ANTIINFLAMATÓRIOS, ANTIEXSUDATIVOS E ANTIPRURIGINOSOS; ANTISSÉPTICOS E CICATRIZANTES e ANTIBIÓTICOS.**

<b>EMULSÃO, CREME OU POMADA FORTE DE BENZOATO DE BENZILA</b>	Benzoato de Benzila ..... 25 - 30% Essência de Alfazema ..... 3% Neomicina ..... 0,5% Emulsão O/A, creme ou pomada base ..... ..... q.s.p.100g/ml	<b>Indicação:</b> Escabiose e Pediculose infectadas. <b>Ação:</b> Acaricida e antimicrobiana.	<b>Uso:</b> A critério médico.
--	---	--	-----------------------------------

<b>LOÇÃO OU CREME COM TIABENDAZOL</b>	Tiabendazol ..... ..... 5 - 15% Loção ou creme ..... base ... q.s.p.100g/ml	<b>Indicação:</b> Escabiose e Larva Migrans. <b>Ação:</b> Anti-helmíntica.	<b>Uso:</b> A critério médico.
---	--	---	-----------------------------------

O *Tiabendazol* é um anti-helmíntico polivalente, especialmente ativo contra Estrongilóides e Larva Migrans.

<b>POMADA COM BÁLSAMO DO PERU</b>	Bálsamo do Peru ..... ..... 10 - 20% Enxofre ..... 10% Pomada base ..... ..... q.s.p.100g	<b>Indicação:</b> Escabiose. <b>Ação:</b> Parasiticida.	<b>Uso:</b> A critério médico.
---	---	--	-----------------------------------

<b>POMADA PARA ESCABIOSE</b>	Sulfureto de Potássio ..... 10g Óxido de Zinco .... 3g Vaselina ..... 3g Lanolina ..... 3g Neomicina ..... 0,5g Pomada base ..... ..... q.s.p.100g	<b>Indicação:</b> Escabiose infectada. <b>Ação:</b> antisséptica e antimicrobiana.	<b>Uso:</b> A critério médico.
--------------------------------------	--	---	-----------------------------------

*Uso Interno:*

<b>TIABENDAZOL CÁPSULAS</b>	Tiabendazol ..... ..... 250 - 500mg	<b>Indicação:</b> Escabiose e Larva Migrans. <b>Ação:</b> Anti-helmíntica.	<b>Posologia:</b> A critério médico.
---------------------------------	--	---	---

O *Tiabendazol* é um anti-helmíntico de amplo espectro. É usado na faixa de 25 a 50 mg/kg ao dia, por um período de, em geral, 15 dias. Não deve-se ultrapassar 3g ao dia.

**Vide seções de ANTIINFLAMATÓRIOS, ANTIEXSUDATIVOS E ANTIPRURIGINOSOS; ANTISSÉPTICOS E CICATRIZANTES e ANTIBIÓTICOS.**

<b>TIABENDAZOL SUSPENÇÃO</b>	Tiabendazol ..... ..... 250mg\5ml Xaropes de morango framboesa, pêssego ou tutti-frutti ..... ..... q.s.p.100ml	<b>Indicação:</b> Escabiose e Larva Migrans. <b>Ação:</b> Anti-helmíntica.	<b>Posologia:</b> A critério médico.
----------------------------------	--	--	--

O *Tiabendazol* é um anti-helmíntico de amplo espectro. É usado na faixa de 25 a 50 mg/kg ao dia, por um período de, em geral, 15 dias. Não deve-se ultrapassar 3g ao dia.

Uma colher de **café** contém **2,5ml**;  
 Uma colher de **chá** contém **5,0ml** ;  
 Uma colher de **sobremesa** contém **10,0ml** e  
 Uma colher de **sopa** contém **15,0ml**.

*Vide seções de ANTIINFLAMATÓRIOS, ANTIEXSUDATIVOS E ANTIPRURIGINOSOS; ANTISSÉPTICOS E CICATRIZANTES e ANTIBIÓTICOS.*