

Aerojet®

sulfato de salbutamol

Xarope

Forma Farmacêutica e Apresentação:

Xarope contendo 2 mg de salbutamol (na forma de sulfato de salbutamol) em cada 5 ml - frasco com 100 ml.

USO PEDIÁTRICO E ADULTO.

Composição:

Cada 5 ml de xarope contém:

Salbutamol (na forma de sulfato de salbutamol) 2 mg

Excipientes: sacarose, glicerol, ácido cítrico, citrato de sódio diidratado, metilparabeno, propilparabeno, essência de groselha, essência de cereja, álcool etílico e água purificada.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

A ação do **Aerojet®** na crise asmática instala-se logo após a sua aplicação e seu efeito prolonga-se, em média, por 6 horas.

O medicamento deve ser mantido em temperatura ambiente (15°C a 30°C), proteger da luz e umidade.

Seu prazo de validade é de 24 meses. Nunca use remédios após o prazo de validade impresso na caixa.

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se você está amamentando.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis, tais como: dores de cabeça, tonturas ou tremores após o uso do produto.

Atenção diabéticos: contém açúcar.

O uso do medicamento é contra-indicado para pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da fórmula.

Se você é diabético ou tem hipertireoidismo, informe ao seu médico.

Informe ao seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

Ao utilizar em crianças, fazê-lo sempre sob supervisão de adultos e conforme recomendação do médico.

Este medicamento não deve ser usado por mulheres grávidas, ou que estejam amamentando sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

NÃO USE REMÉDIOS SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Mecanismo de ação:

O salbutamol, princípio ativo de **Aerojet**[®] exerce ação farmacológica seletiva sobre os receptores beta 2 adrenérgicos, proporcionando rápida e efetiva broncodilatação. Por outro lado, essa ação seletiva brônquica, reduz a ocorrência dos habituais efeitos cardiovasculares indesejáveis comuns a outros broncodilatadores.

Como o salbutamol possui ação seletiva sobre os brônquios, sem influir no aparelho cardiovascular, praticamente não apresenta limitações de uso para cardiopatas e hipertensos.

O salbutamol é metabolizado no fígado e excretado pela urina, sob a forma de um metabólito inativo.

Embora o salbutamol, na forma injetável possa ser utilizado como inibidor do trabalho de parto prematuro, **Aerojet**[®] xarope somente deverá ser usado quando se necessita broncodilatação nas doenças pulmonares, tais como na asma brônquica.

Indicações:

Aerojet[®] é indicado no alívio do espasmo brônquico associado às crises de asma, bronquite crônica e enfisema.

Contra-indicações:

As formulações orais de **Aerojet**[®] não devem ser usadas concomitantemente com betabloqueadores.

Embora o salbutamol seja utilizado na forma injetável ou mesmo em comprimidos para o controle do parto prematuro, as preparações de **Aerojet**[®] não deverão ser utilizadas na vigência de abortamento iminente ou durante o primeiro e segundo trimestre da gravidez.

Precauções e Advertências

Visto que o efeito broncodilatador de cada administração do produto perdura por 6 horas, em média, exceto em processos mais avançados, recomenda-se ao paciente não aumentar as doses e não associar outras medicações sem antes consultar o médico.

Se o medicamento não proporcionar alívio durante pelo menos 3 horas, o paciente deve procurar seu médico para as medidas adicionais necessárias.

O salbutamol deverá ser administrado com cautela em portadores de hipertireoidismo.

Visto que o salbutamol é excretado pelo leite materno, sua utilização em mulheres na época de amamentação não é aconselhável. O produto só deverá ser prescrito nessa condição desde que os benefícios superem as desvantagens eventuais.

Reações Adversas / Efeitos Colaterais:

Ocasionalmente, podem ocorrer náuseas e cefaléia após a utilização do salbutamol por via oral. Em raros casos foi descrito o aparecimento de taquicardia e discreto tremor passageiro nas mãos.

Este último efeito, observado após a administração oral, foi mais acentuado com doses orais de 4 e 5 mg do que após a ingestão de 2 mg.

Não foram relatados efeitos colaterais significativos associados ao tratamento com o **Aerojet**[®] nas doses indicadas.

Em casos de superdosagem com **Aerojet**[®], deve ser utilizado um beta-bloqueador cárdio-seletivo com a cautela necessária em pacientes com broncoespasmo.

Administração durante a gravidez ou aleitamento:

Contra-indica-se o produto no primeiro e segundo trimestre de gravidez.

Uso em Pediatria:

O produto poderá ser utilizado em crianças abaixo de 12 anos por indicação do médico, utilizando-se a posologia preconizada.

Interação Medicamentosa:

Deverá ser levado em conta o efeito broncodilatador do salbutamol quando utilizam-se derivados da teofilina no tratamento de pacientes com asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).

Eventuais reduções das doses do salbutamol poderão ser necessárias.

Posologia:

Para alívio do broncoespasmo:

Adultos

A dose eficaz, na maioria das vezes, é 4 mg de salbutamol (10 mL do xarope), três ou quatro vezes ao dia.

Caso não seja obtida broncodilatação adequada, cada dose pode ser gradualmente aumentada até 8 mg. Contudo, tem-se observado que alguns pacientes obtêm alívio adequado com 2 mg três ou quatro vezes ao dia. Nos pacientes muito sensíveis a estimulantes β -adrenérgicos, é aconselhável iniciar o tratamento com 2 mg, três ou quatro vezes ao dia.

Crianças

As seguintes doses devem ser administradas três ou quatro vezes ao dia:

2-6 anos: 2,5 mL a 5 mL do xarope (1 a 2 mg de salbutamol), três a quatro vezes ao dia.

6-12 anos: 5 mL do xarope (2 mg de salbutamol), três a quatro vezes ao dia.

Acima de 12 anos: 5 mL a 10 mL do xarope (2 a 4 mg de salbutamol). O medicamento é muito bem tolerado pelas crianças, de modo que, se necessário, estas doses podem ser aumentadas a critério do médico.

Superdosagem:

Em casos de eventual superdosagem pelo uso inadvertido do salbutamol, monitorizar o paciente em ambiente hospitalar de emergência utilizando beta- bloqueador cárdio-seletivo.

Lote, Data de Fabricação e Validade: VIDE CARTUCHO.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.



FARMALAB Indústrias Químicas e Farmacêuticas Ltda.

Uma empresa do Grupo Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Rua Dr. Giacomo Chiesi nº 151 - Estrada dos Romeiros Km 39,2

Santana de Parnaíba - SP

C.N.P.J. 61.363.032/0001-46 - ®Marca Registrada - Indústria Brasileira

Reg. MS nº 1.0058.0047

Farm. Resp.: C.M.H.Nakazaki - CRF-SP nº 12.448

SAC (Serviço de Atendimento ao consumidor): 0800-114525

www.chiesibrasil.com.br

Produzido por:

Zambon Laboratórios Farmacêuticos Ltda.

Rua Descampado nº 63

São Paulo –SP