

ALCALERGIN

Glycyrrhiza glabra L., Fabaceae

Herbarium

Leia com atenção antes de usar o produto

FITOTERÁPICO

FORMA FARMACÊUTICA

Xarope.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO

Oral.

APRESENTAÇÕES

Frasco com 120mL.
Frasco com 200mL.

USO ADULTO E CRIANÇAS ACIMA DE 4 ANOS.

COMPOSIÇÃO:

Cada mL contém:
Extrato seco de *Glycyrrhiza glabra* L., Fabaceae (Alcaçuz)..... 222mg
Veículos (Água purificada, xarope de sacarose invertida, aroma de framboesa, aroma de anis, sorbato de potássio e sacarina diidratada sódica).....q.s.p. 1mL

CONCENTRAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ATIVOS

O xarope está padronizado em 1,11 a 1,554% de glicirrizina. Cada mL contém 11,1 a 15,54mg de glicirrizina.

NOMENCLATURA BOTÂNICA OFICIAL

Glycyrrhiza glabra L., Fabaceae.

PARTE UTILIZADA DA PLANTA

Raiz.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Como este medicamento funciona?

ALCALERGIN atua como antiinflamatório, antialérgico e antitussígeno. O alcaçuz possui ação semelhante às drogas corticosteróides, impedindo a formação de substâncias que induzem a inflamação e o processo alérgico, além de acelerar a secreção do muco, facilitando a eliminação de catarros.

Para que este medicamento é indicado?

Em função de sua ação antialérgica, antitussígena e antiinflamatória, ALCALERGIN está indicado para o tratamento de bronquite e eliminação de catarros do trato respiratório superior.

Quando não devo usar este medicamento?

Pacientes que apresentam pressão alta, desordens cardíacas, renais ou hepáticas, diabetes, neoplasias hormônio-dependentes e grande liberação do hormônio estrogênio não devem utilizar o produto. Não deve ser utilizado na lactação, em casos de glaucoma, rigidez muscular e diminuição dos níveis de potássio no sangue.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que possam ficar grávidas durante o tratamento.

Este medicamento é contra-indicado na faixa etária inferior a 4 anos de idade.

Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico.

O produto não deve ser administrado em altas doses e por mais de 4 a 6 semanas, visto que pode ocorrer aumento da pressão sanguínea, desequilíbrio eletrolítico e inchaço, os quais desaparecem após a descontinuação do uso.

Atenção diabéticos: Este medicamento contém açúcar. Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.

O alcaçuz pode interferir com tratamentos hormonais e terapias hipoglicemiantes. A sua administração é incompatível com anti-hipertensivos e corticosteróides. Pode, também, interferir com diuréticos, além dos glicosídeos digitálicos, anti-arrítmicos, inibidores da monoamino oxidase e laxantes contendo cáscara sagrada e óleo mineral.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo o uso de algum outro medicamento.

Como devo usar este medicamento?

ALCALERGIN é apresentado na forma líquida, de cor marrom avermelhado, odor de anis, sabor adocicado e característico do anis.

Adultos: Tomar 5 (cinco) mL, 4 (quatro) vezes ao dia.

Crianças acima de 4 anos: Tomar 2,5 (dois e meio) mL, 2 (duas) vezes ao dia.

Agitar o produto antes de usar.

O produto não deve ser administrado por um período superior a 4 a 6 semanas.

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou de seu cirurgião-dentista.

Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

Quais os males que este medicamento pode causar?

As reações adversas não têm sido associadas com o alcaçuz quando usado na dosagem e período de tratamento recomendado.

O que fazer se alguém usar uma grande quantidade deste medicamento de uma só vez?

A ingestão excessiva e prolongada do alcaçuz, mais de 4 a 6 semanas, pode causar aumento da pressão arterial, desequilíbrio eletrolítico, inchaço e ganho de peso, bem como fraqueza muscular e câimbra. Em indivíduos que utilizaram o alcaçuz por muitos anos, estes sintomas desapareceram, freqüentemente, em até duas semanas após a sua retirada.

Efeitos anti-estrogênicos foram observados com o uso de altas doses.

Em caso de superdosagem, recomenda-se suspender o uso e procurar orientação médica.

Onde e como devo guardar este medicamento?

Mantém em temperatura ambiente (15 a 30°C). Proteger da luz, do calor e da umidade.

Mantém o frasco bem fechado.

Nestas condições, o medicamento se manterá próprio para o consumo, respeitando o prazo de validade indicado na embalagem.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Características farmacológicas

ALCALERGIN é constituído pelo extrato seco de alcaçuz (*Glycyrrhiza glabra*) padronizado em glicirrizina. A glicirrizina, o princípio ativo do alcaçuz, se liga aos receptores glicocorticóides e mineralocorticóides, inibindo, desta forma, a enzima 11 β -hidroxiesteróide desidrogenase, a qual converte o cortisol em cortisona. A ação antiinflamatória da glicirrizina ocorre pelos efeitos semelhantes aos corticosteróides resultantes desta ligação e, ainda, pela ação antitrombina, a qual ocorre através da inibição da trombina induzida pela agregação plaquetária. A ação antialérgica ocorre, também, pelo efeito semelhante aos glicocorticóides. As propriedades antitussígenas do alcaçuz são atribuídas a glicirrizina, a qual acelera a secreção do muco traqueal.

Indicações

Atua como antiinflamatório, antialérgico e antitussígeno, sendo indicado para o tratamento da bronquite e eliminação de catarros do trato respiratório superior.

Contra-indicações

Gravidez e lactação.

Pacientes que apresentam hipertensão arterial, desordens cardíacas, renais ou hepáticas, diabetes, neoplasias hormônio-dependentes e grande liberação do hormônio estrogênio não devem utilizar o produto. Não deve ser utilizado na lactação, em casos de glaucoma, hipertonia e hipocalemia.

Posologia e modo de usar

Adultos: Ingerir 5 (cinco) mL, 4 (quatro) vezes ao dia.

Crianças acima de 4 anos: Ingerir 2,5 (dois e meio) mL, 2 (duas) vezes ao dia.

Agitar o produto antes de usar.

O produto não deve ser administrado por um período superior a 4 a 6 semanas.

Cuidados de conservação depois de aberto

Mantém o medicamento em sua embalagem original, protegendo-o da luz, do calor e da umidade.

Advertências

Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico.

O produto não deve ser administrado em altas doses e por mais de 4 a 6 semanas, visto que pode provocar desequilíbrio eletrolítico acompanhado por hipertensão arterial e edema, os quais desaparecem após a descontinuação do uso.

Atenção diabéticos: Este medicamento contém açúcar.

De acordo com a categoria de risco de fármacos destinados às mulheres grávidas, este fitoterápico apresenta categoria de risco X. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que possam ficar grávidas durante o tratamento.

Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco

Crianças acima de 4 anos devem ingerir 2,5 (dois e meio) mL, duas vezes ao dia. Não existem recomendações específicas para o uso do ALCALERGIN em pacientes idosos e outros grupos de risco.

Interações medicamentosas

O uso do alcaçuz pode interferir com tratamentos hormonais. Pode, também, interferir com terapias hipoglicemiantes devido ao sinergismo entre a insulina e a glicirrizina, o qual resulta em hipocalemia e retenção de sódio.

A sua administração é incompatível com tratamentos anti-hipertensivos e com corticóides, uma vez que a glicirrizina, o princípio ativo do alcaçuz, promove hipertensão e edema pela retenção de sódio.

O alcaçuz potencializa a toxicidade dos glicosídeos cardíacos, como os digitálicos, devido à redução de potássio no sangue. Não deve ser utilizado, também, com drogas anti-arrítmicas como a procainamida e quinidina.

O seu uso juntamente com laxantes contendo cáscara sagrada e óleo mineral aumenta a perda de potássio.

Não deve ser utilizado simultaneamente com diuréticos.

Os efeitos dos inibidores da monoamino oxidase podem ser exacerbados quando utilizados com o alcaçuz.

Reações adversas

As reações adversas não têm sido associadas com o alcaçuz quando usado na dosagem e período de tratamento recomendado.

Superdosagem

A ingestão excessiva e prolongada do alcaçuz, mais de 4 a 6 semanas, resulta em sintomas típicos de aldosteronismo primário, baixos níveis de atividade plasmática da renina, aldosterona e hormônio diurético, bem como fraqueza muscular e câimbra. Estes sintomas desaparecem, freqüentemente, em até duas semanas após a retirada do alcaçuz.

Efeitos anti-estrogênicos foram observados com o uso de altas doses.

Em caso de superdosagem, recomenda-se suspender o uso e procurar orientação médica.

Armazenagem

Manter em temperatura ambiente (15 a 30°C). Proteger da luz, do calor e da umidade.

Lote, data de fabricação e validade: vide embalagem.

HERBARIUM LABORATÓRIO BOTÂNICO LTDA.

Av. Santos Dumont, 1111 Colombo - PR • CNPJ 78.950.011/0001-20 • Indústria Brasileira.

Farmacêutica resp.: Dra. Anny M. M. Trentini CRF PR-4081

MS: 1.1860.0049

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 0800 723 8383