

# Alcalone Plus

hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, dimeticona



---

## USO ADULTO E PEDIÁTRICO

### FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Suspensão: Frascos com 240 ml e com 100 ml.

### COMPOSIÇÃO

#### Suspensão:

Cada colher das de chá ou 5 ml contém:

Hidróxido de Magnésio .....	200 mg
Hidróxido de Alumínio .....	200 mg
Dimeticona .....	20 mg
Excipientes ( Açúcar, Nipagin, Nipazol, Ess. de Caramelo, Sacarina sódica, Sorbitol, Hidroxietilcelulose) q.s.p. ....	5 ml

---

### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

- Conservar em local fresco e ao abrigo da umidade.
- O produto não deve ser utilizado fora do prazo de validade indicado no cartucho sob risco de não produzir os efeitos esperados.
- A associação de Hidróxido de Magnésio ao Hidróxido de Alumínio confere a ALCALONE PLUS propriedades antiácidas , sem causar constipação intestinal ou efeito laxante pelo antagonismo de ação destas duas bases.
- Informar o médico a ocorrência de gravidez durante o tratamento ou caso surjam reações desagradáveis como náuseas e vômitos.
- Contra-indicações e precauções: pacientes portadores de doenças renais só deverão utilizar o medicamento sob orientação médica.

**“TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.”**

**“NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO; PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.”**

---

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ALCALONE PLUS encerra um polímero da sílica, a Dimeticona, de ação antiácida devido a presença dos Hidróxidos de Alumínio e Magnésio.

Diversos trabalhos vieram demonstrar a importância da Dimeticona no tratamento da aerofagia e na eliminação de gases excessivos acumulados no trato gastrointestinal.

Rider e colaboradores demonstraram em experiência clínica, em cerca de 200 pacientes, sua importância no tratamento de pacientes com excesso de gases no trato gastrointestinal ( Use of silicone in the treatment of intestinal gas and bloating-JAMA-Dec. 17/60)

Por outro lado, a formação de bolhas de gases no trato gastrointestinal contribui para o aumento da acidez que deverá ser corrigida a fim de evitar a contínua formação das mesmas.

### INDICAÇÕES

Como antiácido e antiflatulento.

Como coadjuvante no tratamento da úlcera péptica, ou outras doenças gastrointestinais, onde é necessário neutralizar o elevado grau de acidez.

## **CONTRA-INDICAÇÕES**

Os antiácidos que contêm Hidróxido de Alumínio formam complexos com a Tetraciclina tornando-a inabsorvível, portanto, ALCALONE PLUS não deve ser usado por pacientes que estejam fazendo uso de qualquer forma de Tetraciclina.

## **PRECAUÇÕES**

Pacientes com insuficiência renal, salvo sob vigilância médica, não devem fazer uso de ALCALONE PLUS uma vez que o Hidróxido de Magnésio pode causar depressão do sistema nervoso central em presença deste tipo de distúrbio. O Hidróxido de Alumínio, na vigência de dietas hipofosforadas pode provocar uma deficiência de fósforo.

**Pacientes Idosos:** Não existem advertências ou recomendações especiais sobre o uso do produto por pacientes idosos. Devendo levar em consideração o estado geral do paciente.

**Gravidez e Lactação:** Antes de usar um antiácido consulte seu médico.

## **REAÇÕES ADVERSAS**

Doses excessivas podem provocar perturbações gastrintestinais como náuseas e vômitos.

## **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

Os antiácidos orais podem reduzir a absorção de certos fármacos, particularmente Tetraciclina, fenitoínas, digoxina, agentes hipoglicêmicos e antagonistas H<sub>2</sub>, desta forma, ALCALONE PLUS deve ser administrado pelo menos uma hora antes ou depois da administração destes medicamentos.

## **POSOLOGIA**

### **Suspensão:**

Crianças: 1 colher das de chá, 1 a 2 vezes ao dia.

Adultos: 1 a 2 colheres de sobremesa (10 ml), 4 vezes ao dia.

**NOTA: ALCALONE PLUS deve ser tomado de meia a uma hora após as refeições e ao deitar.**

**AGITE A SUSPENSÃO ANTES DE USAR.**

### **SUPERDOSAGEM:**

Conduza na superdosagem: na eventualidade de injeção acidental de doses muito acima da preconizada, recomenda-se adotar as medidas habituais de controle das funções vitais.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS  
PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

Nº do lote, data de fabricação e validade: vide cartucho.

Reg. MS nº 1.0577.0002.004.5

Farm. Responsável: Dra. Elaine C.M.Pessoa - CRF-SP nº 14.059



**BUNKER INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA**

Rua: Aníbal dos Anjos Carvalho, 212 Cidade Dutra

São Paulo - SP - Fone: (11) 5666-0266

C.N.P.J. 47.100.862/0001-50

Serviço de Atendimento ao Cliente: **SAC 0800.142110**

INDÚSTRIA BRASILEIRA