

Item: Bula - 706340 Laetus: 45

Produto: ANASEPTIL

Dimensões: 135 X 160 mm - **Cor:** Black C (100% e 20%)

Acabamento: bula com dobra

Motivo da alteração: Novo formato padrão e posicionamento do cód. Laetus

Data: 13/09/2005

ANASEPTIL

sulfato de polimixina B + associações



FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

ANASEPTIL (sulfato de polimixina B, sulfato de neomicina, bacitracina, óxido de zinco e peróxido de zinco) pó - tubo contendo 10 g.

USO ADULTO OU PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada grama contém 5.000,0 UI de sulfato de polimixina B, 5,0 mg de sulfato de neomicina, 500,0 UI de bacitracina, 635,3 mg de óxido de zinco e 200,0 mg de peróxido de zinco. Excipiente: celulose microcristalina.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Este medicamento contém em sua fórmula substâncias que agem de forma complementar no tratamento das infecções da pele.

O produto deve ser conservado em sua embalagem original ao abrigo da luz e umidade. O prazo de validade encontra-se impresso na embalagem externa. Não utilize medicamento com o prazo de validade vencido. Este produto deverá ser aplicado apenas na pele; nunca use este produto nas mucosas (mucosa oral, mucosa nasal, mucosa vaginal, etc). Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando.

Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis, em especial sintomas de hipersensibilidade ao medicamento, tais como coceira ou vermelhidão na área de aplicação ou nas áreas próximas.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

Este medicamento é contra-indicado para pessoas com alergia a qualquer componente da fórmula.

NÃO USE REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Os sais de zinco protegem a pele sobretudo nas áreas de fricção, absorvendo a umidade e secando a pele macerada. Os antibióticos constantes da fórmula (sulfato de polimixina B, sulfato de neomicina, bacitracina) são ativos contra as principais espécies patogênicas gram-positivas e gram-negativas responsáveis por infecções cutâneas.

INDICAÇÕES

Indicado como anti-séptico tópico para tratamento e profilaxia de infecções cutâneas provocadas por bactérias sensíveis aos componentes da fórmula, principalmente em áreas intertriginosas.

CONTRA-INDICAÇÕES

É CONTRA-INDICADO NOS PACIENTES COM HISTÓRIA DE HIPERSENSIBILIDADE AOS COMPONENTES DA FÓRMULA.

PRECAUÇÕES

O PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO SOBRE AS MUCOSAS.

REAÇÕES ADVERSAS

SÃO RARAS. PORÉM, EM PESSOAS ALÉRGICAS O USO DESTES MEDICAMENTOS PODERÁ, EVENTUALMENTE, PROVOCAR REAÇÕES DE HIPERSENSIBILIDADE CUTÂNEA.

POSOLOGIA

Aplicar sobre a região afetada 1 a 3 vezes ao dia.

SUPERDOSAGEM

Ainda não foram descritos casos de superdose.

Pacientes idosos

Não há restrições ou recomendações especiais com relação ao uso do produto por pacientes com idade acima de 65 anos.

Nº do lote, data de fabricação e prazo de validade: ver cartucho.

Farm. Resp.: J.G. Rocha CRF-SP nº 4067 MS - 1.0394.0485 - CNPJ 61.150.819/0001-20 Indústria Brasileira.

706340



FARMASA

LABORATÓRIO AMERICANO DE FARMACOTERAPIA S.A.

RUA NOVA YORK, 245 - 04560-908 - SÃO PAULO - SP - SAC 0800 11 4033 - www.farmasa.com.br