



argirol® 10%

vitelinato de prata

FORMA FARMACÉUTICA E APRESENTAÇÃO

Frasco plástico conta-gotas contendo 5 ml de solução oftálmica estéril.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

SOLUÇÃO OFTÁLMICA

Cada ml contém: 100 mg de vitelinato de prata.

Veículo: Clorobutanol e água purificada q.s.p..

INFORMAÇÃO AO PACIENTE

- Ação esperada do medicamento: ação anti-séptica.
- Cuidados de armazenamento: o produto deve ser armazenado a temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) e ao abrigo da luz.
- Prazo de validade: Vide cartucho. Não use medicamento com prazo de validade vencido.
- Gravidez e lactação: informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se estiver amamentando.
- Cuidados de administração: instile a dose recomendada, no saco conjuntival, evitando tocar a ponta do frasco nos tecidos oculares. Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.
- Interrupção do tratamento: não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
- Reações adversas: informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

- Contra-indicações e precauções: informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

NÃO USE REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE.

Informação Técnica

Argirol® contém vitelinato de prata a 10% na forma de solução oftálmica estéril para uso tópico oftálmico.

É um derivado protéico com ação antibacteriana, que contém baixa concentração de íons prata livres, sendo, por isso, menos irritante para os tecidos oculares.

Indicações

Como coadjuvante na profilaxia da oftalmia dos recém-nascidos. Tratamento alternativo das conjuntivites.

Contra-Indicações

Não se conhecem contra-indicações para o uso do produto.

Precauções e Advertências

A aplicação prolongada de sais de prata em superfícies mucosas ou lesões abertas pode ocasionar argíria, coloração preto-azulada da pele devida à deposição de grânulos de um composto de prata no tecido conectivo.

Embora ocorra regressão lenta e espontânea, na maior parte dos casos, essa coloração dos tecidos pode permanecer indefinidamente em alguns locais.

Interações Medicamentosas

Não são conhecidas interações com outros medicamentos.

Reações Adversas

Não são conhecidas a intensidade e frequência das reações adversas.

Posologia

Instile 1 gota no saco conjuntival, 3 a 4 vezes por dia, ou a critério médico.

Superdosagem

Em geral, superdosagens não provocam problemas agudos. Se acidentalmente, for ingerido, beba bastante líquido para diluir, ou procure orientação médica.

Pacientes Idosos

Não existem restrições de uso em pacientes idosos. A posologia é a mesma que a recomendada para as outras faixas etárias.

Nº de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

MS - 1.0147.0106

Resp. Téc.: Dra Maria Paula Marques Gomes
CRF-SP nº 11.682



Qualidade e Tradição a Serviço da Oftalmologia

ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
Av. Guarulhos, 3180 - CEP 07030-000 - Guarulhos - SP
CNPJ 43.426.626/0009-24
Indústria Brasileira
® Marca Registrada
Texto adaptado à portaria 110/97

Serviço de Atendimento ao Consumidor
0800-144077
Disagem Direta Gratuita

7199BR14P
Laetus: 145

LARAMARA