

**achē**

# CANDICORT

**cetoconazol**

**dipropionato de betametasona**

**FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES**

Creme dermatológico - Pomada dermatológica  
Creme dermatológico em bisnaga de 10 e 30 g  
Pomada dermatológica em bisnaga de 10 e 30 g

**USO TÓPICO - NÃO INGERIR**

**USO ADULTO E PEDIÁTRICO**

**COMPOSIÇÃO:**

Cada g do creme dermatológico contém:

cetoconazol .....20 mg  
dipropionato de betametasona (equivalente a 0,5 mg de betametasona) .....0,64 mg

*Excipientes:* álcool cetoestearílico, base de lanolina e petrolato, clorocresol, petrolato líquido, fosfato de sódio monobásico monoidratado, dimeticona, simeticona, propilenoglicol e água purificada.

Cada g da pomada dermatológica contém:

cetoconazol .....20 mg  
dipropionato de betametasona (equivalente a 0,5 mg de betametasona) .....0,64 mg

*Excipientes:* base de petrolato e polietileno.

**PESO LÍQUIDO:**

Creme: 10 e 30 g

Pomada: 10 e 30 g

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

**Como este medicamento funciona?**

**CANDICORT** é um medicamento para ser aplicado na pele, que age como antiinflamatório (contra inflamação) e contra micoses (doenças inflamatórias da pele causadas por fungos ou leveduras).

**Por que este medicamento foi indicado?**

**CANDICORT** é indicado no tratamento de micoses (doenças inflamatórias da pele) que foram afetadas ou possam ser afetadas por fungos ou leveduras.

**Quando não devo usar este medicamento?**

**CANDICORT NÃO DEVE SER USADO EM PACIENTES QUE APRESENTEM ALERGIA A QUAISQUER DOS COMPONENTES DO MEDICAMENTO.**

O PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO NOS OLHOS E AO REDOR DELES.

**CANDICORT NÃO DEVE SER UTILIZADO EM DETERMINADAS INFECÇÕES DA PELE, TAIS COMO: VARICELA, HERPES SIMPLES OU ZOSTER, TUBERCULOSE CUTÂNEA OU SÍFILIS CUTÂNEA. PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA CASO VOCÊ TENHA ALGUMA DESTAS DOENÇAS ANTES DE USAR O MEDICAMENTO.**

**Quando a administração de CANDICORT requer cuidados especiais?**

DURANTE O TRATAMENTO COM **CANDICORT**, VOCÊ NÃO DEVE USAR COSMÉTICOS SOBRE A ÁREA DA PELE TRATADA. SE OCORRER IRRITAÇÃO NO LOCAL ONDE O PRODUTO FOI APLICADO, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA, POIS SOMENTE O MÉDICO PODERÁ AVALIAR A EVOLUÇÃO DO TRATAMENTO E DECIDIR QUANDO E COMO O TRATAMENTO DEVE SER DESCONTINUADO.

**ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MULHERES GRÁVIDAS SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

**CANDICORT NÃO DEVE SER USADO DURANTE A AMAMENTAÇÃO, EXCETO SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

**CANDICORT pode ser utilizado por períodos prolongados?**

**CANDICORT NÃO DEVE SER USADO EM ÁREAS EXTENSAS, EM GRANDE QUANTIDADE E POR PERÍODOS MAIORES QUE 2 SEMANAS.**

EM CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS, DEVEM SER UTILIZADAS PEQUENAS QUANTIDADES DE **CANDICORT**.

ADULTOS E CRIANÇAS NÃO DEVEM USAR MAIS QUE 45 GRAMAS POR SEMANA.

**O que pode ocorrer se utilizar o medicamento por uma via de administração não-recomendada?**

O PRODUTO DEVE SER APLICADO SOMENTE NA PELE. NÃO USAR DE OUTRA MANEIRA (POR VIA DE ADMINISTRAÇÃO NÃO-RECOMENDADA), POIS PODE CAUSAR RISCOS. APLICAÇÃO EM OUTRAS ÁREAS QUE NÃO SEJA A PELE, COMO POR EXEMPLO, OS OLHOS, PODE CAUSAR REAÇÕES ADVERSAS (EFEITOS NÃO-DESEJADOS) E NÃO TRAZER BENEFÍCIOS.

**CANDICORT pode ser utilizado com outros medicamentos?**

Não existe prova suficiente de que outros medicamentos causem modificações importantes no efeito habitual, ou seja, interajam com **CANDICORT**. Mas, interações podem surgir com alguns medicamentos quando utilizados durante o tratamento com **CANDICORT**, como por exemplo, medicamentos prejudiciais ao fígado; anticoagulantes como dicumarol; ciclosporinas; famotidina; isoniazida; rifampicina; fenitoína; terfenadina; indinavir; saquinavir; ritonavir e/ou cisaprida.

**Durante o tratamento com CANDICORT pode-se tomar bebidas alcoólicas?**

Evite a ingestão de bebida alcoólica durante o tratamento.

**NÃO HÁ CONTRA-INDICAÇÃO RELATIVA A IDADE (FAIXAS ETÁRIAS).**

**INFORME AO MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS.**

**INFORME AO SEU MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA SE VOCÊ ESTÁ FAZENDO USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO.**

**NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO**

200 mm

160 mm

**DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.**

**ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MULHERES GRÁVIDAS SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DO CIRURGIÃO-DENTISTA.**

**CANDICORT NÃO DEVE SER USADO DURANTE A AMAMENTAÇÃO, EXCETO SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

**Como devo usar este medicamento?**

**CANDICORT** deve ser utilizado apenas sob orientação médica.

A via de administração é na pele (uso tópico). Aplique uma fina camada do creme ou pomada sobre a área afetada da pele, 1 vez ao dia. Em casos mais graves ou conforme orientação médica, pode ser necessária a aplicação 2 vezes ao dia.

**CANDICORT** não deve ser utilizado por períodos maiores que 2 semanas.

Em crianças menores de 12 anos, devem ser usadas pequenas quantidades de **CANDICORT**.

Adultos e crianças não devem utilizar mais que 45 gramas por semana.

Cada grama de **CANDICORT** creme ou pomada contém 20 mg de cetoconazol e 0,64 mg de dipropionato de betametasona, equivalente a 0,5 mg de betametasona.

**Instruções para abrir a bisnaga:**

1. Para sua segurança, esta bisnaga está bem lacrada. Esta embalagem não requer o uso de objetos cortantes.




fig. 1

2. Retire a tampa da bisnaga (fig. 1).




fig. 2

3. Com a parte pontiaguda superior da tampa, perfure o lacre da bisnaga (fig. 2).

**SIGA A ORIENTAÇÃO DE SEU MÉDICO, RESPEITANDO SEMPRE OS HORÁRIOS, AS DOSES E A DURAÇÃO DO TRATAMENTO.**

**NÃO INTERROMPA O TRATAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. SOMENTE ELE PODERÁ AVALIAR A EVOLUÇÃO DO TRATAMENTO E DECIDIR QUANDO E COMO ESTE TRATAMENTO PODERÁ SER INTERROMPIDO.**

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE SEU CIRURGIÃO-DENTISTA.**

**NÃO USE O MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ANTES DE USAR OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO.**

**Qual é o aspecto deste medicamento?**

**CANDICORT** creme ou pomada se apresenta como uma massa homogênea, branca, livre de impurezas visíveis.

O creme ou a pomada tem odor (cheiro) característico.

**Quais os males que este medicamento pode causar?**

AS REAÇÕES INDESEJÁVEIS (REAÇÕES ADVERSAS) QUE PODEM SER ATRIBUÍDAS AO USO DO MEDICAMENTO, SÃO: ARDÊNCIA, COCEIRA, IRRITAÇÃO, RESSECAMENTO, FOLICULITE (CONJUNTO DE INFECÇÕES SUPERFICIAIS COMUNS DOS FOLÍCULOS CAPILARES, QUE PODE PROVOCAR QUEDA DOS CABELOS), HIPERTRICOSE (DESENVOLVIMENTO ANORMAL DE PÊLOS NUMA REGIÃO QUE NÃO OS TEM OU QUE NORMALMENTE SÓ APRESENTA UMA PENUGEM), DERMATITE PERIORAL, MACERAÇÃO CUTÂNEA, INFECÇÃO SECUNDÁRIA, ATROFIA CUTÂNEA, DERMATITE DE CONTATO, MILIÁRIA E/OU ESTRIAS.

**O que fazer se alguém usar uma grande quantidade deste medicamento de uma só vez?**

A aplicação exagerada sobre a pele pode levar à vermelhidão, inchaço e sensação de queimação que desaparecerão quando o tratamento for suspenso (descontinuado). Em caso de uso excessivo e/ou ingestão acidental, cuidados devem ser tomados, tais como: entrar imediatamente em contato com seu médico ou procurar um pronto-socorro, informando a quantidade utilizada, horário da utilização e os sintomas.

**Onde e como devo guardar este medicamento?**

Como todo medicamento, **CANDICORT** deve ser guardado em sua embalagem original até sua total utilização. Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

**Qual o prazo de validade de CANDICORT?**

O prazo de validade de **CANDICORT** é de 24 meses a contar da data de sua fabricação indicada na embalagem do produto.

Ao utilizar o medicamento, confira sempre seu prazo de validade. Nunca use medicamento com o prazo de validade vencido. Além de não obter o efeito desejado, as substâncias podem estar alteradas e causar prejuízo para a sua saúde.

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

**DIZERES LEGAIS**

MS - 1.0573.0066

Farmacêutico Responsável: Dr. Wilson R. Farias

CRF-SP nº 9555

**Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.**

Via Dutra, km 222,2 - Guarulhos - SP

CNPJ 60.659.463/0001-91 - Indústria Brasileira

Número de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide embalagem externa

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA**

