

Cetirizin®

dicloridrato de cetirizina

FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES

CETRIZIN® (dicloridrato de cetirizina) comprimidos revestidos: cartucho com 6 comprimidos revestidos.

CETRIZIN® (dicloridrato de cetirizina) solução oral (gotas): cartucho contendo frasco de vidro com 7 mL.

USO ADULTO E/OU PEDIÁTRICO

Uso oral

Composição:

Cada comprimido revestido de CETRIZIN® (dicloridrato de cetirizina) contém: dicloridrato de cetirizina 10 mg

Excipientes: q.s.p. 1 comprimido revestido

Excipientes: lactose, amido de milho, povidona, estearato de magnésio, talco, copolímero de ácido metacrílico, macrogol, dióxido de titânio.

Cada mL (20 gotas) de CETRIZIN® (dicloridrato de cetirizina) solução oral (gotas) contém:

dicloridrato de cetirizina 10 mg

Veículo: q.s.p. 1 mL

Veículo: glicerol, propilenoglicol, sacarina sódica, metilparabeno, propilparabeno, acetato de sódio, ácido acético, água purificada.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

CETRIZIN® (dicloridrato de cetirizina) apresenta como substância ativa o dicloridrato de cetirizina, uma medicação anti-histamínica. Os anti-histamínicos bloqueiam a ação de substâncias químicas chamadas histaminas, produzidas pelo corpo em resposta à presença de um alérgeno, numa reação que se chama alergia. As histaminas causam inchaço e congestão das vias nasais e aumento na produção de muco, coceira na pele ou nos olhos, inchaços pelo corpo, além de outras reações alérgicas. Os anti-histamínicos bloqueiam a ação da histamina e com isso diminuem os sintomas alérgicos.

O alívio dos sintomas costuma ocorrer nas primeiras horas após a ingestão do produto.

A eliminação do dicloridrato de cetirizina é essencialmente pelos rins, sendo que 60% da dose é excretada na urina de forma inalterada. A meia-vida da cetirizina (tempo para que metade da dose de cetirizina seja eliminada do sangue) é aumentada em pacientes com insuficiência renal. O dicloridrato de cetirizina é excretado no leite materno.

POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

CETRIZIN® (dicloridrato de cetirizina) é indicado para o tratamento da rinite alérgica, conjuntivite alérgica, urticária e outros tipos de alergia.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

CONTRA-INDICAÇÕES

O uso de CETRIZIN® (dicloridrato de cetirizina) é contra-indicado em pacientes com alergia conhecida a qualquer componente da fórmula, em crianças menores de 2 anos e em mulheres que estejam amamentando.

"ESTE MEDICAMENTO É CONTRA-INDICADO PARA CRIANÇAS ABAIXO DE 2 ANOS."

ADVERTÊNCIAS

Se você tem problemas nos rins, avise seu médico antes de usar este medicamento, pois a dose de CETRIZIN® deverá ser ajustada.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.

"INFORME AO MÉDICO O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS."

PRECAUÇÕES

Gravidez: mulheres grávidas não devem utilizar este produto. Mulheres que engravidarem durante o tratamento devem comunicar o médico, que decidirá sobre a interrupção do uso do medicamento ou à sua continuidade.

Lactação: não é indicado o uso de CETRIZIN® durante o aleitamento, pois o dicloridrato de cetirizina é excretado no leite materno.


Idosos: até o presente momento, não há dados sobre efeitos colaterais específicos ou que determinem o ajuste de doses em pacientes idosos.

Pacientes com insuficiência renal: em pacientes com insuficiência renal, a dose a ser administrada deve ser reduzida à metade da dosagem usual.

Não exceda a dose recomendada pelo médico, principalmente se estiver dirigindo ou operando máquinas.

Durante o tratamento, o paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas.

"NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO,



PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE."

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Os pacientes que estão em tratamento com qualquer medicação anti-histamínica, inclusive com o CETRIZIN®, devem evitar a ingestão excessiva de álcool.

"INFORME AO SEU MÉDICO SE VOCÊ ESTÁ FAZENDO USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO."

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

ASPECTO FÍSICO

CETRIZIN® (dicloridrato de cetirizina) Solução oral (Gotas): a solução é límpida e levemente amarelada.

CETRIZIN® (dicloridrato de cetirizina) Comprimidos Revestidos: os comprimidos são brancos, redondos, biconvexos com vinco em uma das faces e logotipo na outra.

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

CETRIZIN® (dicloridrato de cetirizina) Solução oral (Gotas): possui um fraco odor acético (avinagrado).

CETRIZIN® (dicloridrato de cetirizina) Comprimidos Revestidos: não possui odor.

DOSAGEM

CETRIZIN® (dicloridrato de cetirizina) Comprimidos Revestidos:

A posologia habitual para adultos e crianças com idade superior a 12 anos é de 1 comprimido ao dia, por via oral.

Pacientes com insuficiência renal: a dose deve ser reduzida para meio comprimido ao dia.

CETRIZIN® (dicloridrato de cetirizina) Solução Oral (Gotas):

Adultos e crianças a partir de 12 anos: 20 gotas (10 mg) uma vez ao dia.

Crianças de 6 a 12 anos: 10 gotas (5 mg) pela manhã e à noite.

Crianças de 2 a 6 anos: A segurança do uso nesta faixa etária não está completamente estabelecida. Exclusivamente a critério médico, podem ser prescritas 5 gotas (2,5 mg) pela manhã e à noite ou 10 gotas (5 mg) uma vez ao dia.

Idosos: Até o presente, não existem estudos que demonstrem a necessidade de redução de dose em pacientes idosos.

Pacientes com insuficiência renal: a dose a ser administrada deve ser reduzida à metade da posologia usual.

"SIGA A ORIENTAÇÃO DE SEU MÉDICO, RESPEITANDO SEMPRE OS HORÁRIOS, AS DOSES E A DURAÇÃO DO TRATAMENTO."

"NÃO INTERROMPA O TRATAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO."

"NÃO USE O MEDICAMENTO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ANTES DE USAR OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO."

"ESTE MEDICAMENTO NÃO PODE SER PARTIDO OU MASTIGADO."

COMO USAR

Os comprimidos devem ser tomados de preferência com um copo de água. As gotas poderão ser usadas diretamente na boca ou diluídas em água (qualquer volume, desde que se tome todo o conteúdo de água).

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Informe seu médico sobre o aparecimento de reações desagradáveis, como problemas intestinais, boca seca, sonolência, dores de cabeça, tontura e agitação. Alguns pacientes podem apresentar reações de hipersensibilidade, incluindo reações na pele, como rash (vermelhidão) e prurido (coceira), e o angioedema (inchaço embaixo da pele).

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTES MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?

O principal sintoma de superdosagem é a sonolência aumentada. Se você acidentalmente ingerir uma quantidade maior do que deveria, procure socorro médico imediatamente.

ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar em temperatura ambiente (entre 15-30°C), proteger da luz, calor e umidade.

"TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS."

Registro M.S.: 1.0082.0058

Farmacêutico Responsável: Dr. Rogério M. Massonetto - CRF-SP nº. 22.965
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Número do lote, data de fabricação e validade: vide rótulo e cartucho.



1045205



Solvay
Farma

SOLVAY FARMA LTDA.

Rua Salvador Branco de Andrade, 93
Taboão da Serra - SP - Indústria Brasileira
CNPJ: 60.499.639/0001-95

SAC
0800-0141500
www.solvayfarma.com.br