

Ciclomidrin Colírio

Tropicamida 1%

Midriático e cicloplégico

Uso adulto

Composição

Tropicamida 10 mg

Veículo estéril q.s.p. 1 ml

Conservante: cloreto de benzalcônio 0,01%

Informação técnica

A tropicamida é uma droga anticolinérgica usada para produzir midríase e cicloplegia. Tópicamente aplicada nos olhos, a tropicamida bloqueia a ação da acetilcolina, resultando no relaxamento do músculo esfíncter da íris (inervado colinergicamente) e permitindo dilatação da pupila pelo músculo radial (inervado adrenergicamente).

A tropicamida tem um início de ação mais rápido e duração de efeito menos prolongada do que as outras drogas midriáticas.

Indicações

Midriático e cicloplégico.

Contra-indicações

Pacientes sob suspeita ou acometidos de glaucoma de ângulo fechado e em pacientes que demonstrem hipersensibilidade aos componentes do produto.

Reações adversas

Aumento da pressão intra-ocular. Ocasionalmente podem ocorrer ardor passageiro, boca seca, visão borrada ou reações alérgicas.

Posologia

Instilar 1 ou 2 gotas no saco conjuntival, de acordo com o critério médico. Decorridos 5 minutos, instilar mais 1 ou 2 gotas. Se o paciente não for atendido nos 20 a 30 minutos decorridos da primeira instilação, deve ser aplicada uma gota adicional, a fim de prolongar os efeitos cicloplégico e midriático.

Apresentação

Solução oftálmica estéril - frasco plástico conta-gotas contendo 5 ml

"VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA"

Ciclomidrin (tropicamida 1%): Reg. M.S. 1.1725.0026.002-7

Responsável Técnico: Dr. Morio Sato - CRF-SP: nº 0381

Nº de lote, data da fabricação e validade: vide cartucho

Fabricado por: LATINOFARMA INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS LTDA.

R. Dr. Tomás Sepe, 489 - Cotia – SP

C.N.P.J. nº 60.084.456/0001-09 - Indústria Brasileira

Atendimento ao Consumidor (11) 4702 5322