

Cintilan[®]

piracetam

Medley.

FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES

Cápsulas: cartucho contendo 60 cápsulas.
Solução injetável: cartucho contendo 12 ampolas.
Solução oral: frasco com 120 ml.
USO PEDIÁTRICO OU ADULTO

COMPOSIÇÕES

CINTILAN[®] **cápsulas**: cada cápsula contém:
piracetam 400,0 mg
excipiente q.s.p. 1 cápsula (talco).

CINTILAN[®] **solução injetável**: cada ampola contém:

piracetam 1000,0 mg
veículo q.s.p. 5,0 ml
(acetato de sódio triidratado e água para injeção).

CINTILAN[®] **solução oral**: cada ml contém:
piracetam 60,0 mg
veículo q.s.p. 1,0 ml
(acetato de sódio triidratado, álcool etílico, aroma de caramelo, aroma de framboesa, ciclamato de sódio, corante vermelho ponceau 4R, glicerol, metilparabeno, propilparabeno, sacarina diidratada sódica, sorbitol, água deionizada).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

• **Ação esperada do medicamento:** CINTILAN[®] contém piracetam, substância que age a nível dos neurônios corticais exercendo influência favorável sobre a capacidade intelectual e relacionamento.

• **Cuidados de armazenamento:** CINTILAN[®] cápsulas: conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade. CINTILAN[®] solução injetável: evitar local quente (temperatura entre 30 - 40°C). Proteger da luz. CINTILAN[®] solução oral: conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz.

• **Prazo de validade:** 60 meses a partir da data de fabricação, impressa na embalagem externa do produto. Não utilize o medicamento se o prazo de validade estiver vencido.

• **Gravidez e lactação:** deve-se evitar a utilização de CINTILAN[®] durante o primeiro trimestre

da gravidez. Nos meses seguintes, os benefícios e riscos decorrentes de seu uso devem ser cuidadosamente avaliados. Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término e se estiver amamentando.

• **Cuidados de administração:** siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

• **Interrupção do tratamento:** não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

• **Reações adversas:** informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

"TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS."

• **Contra-indicações e Precauções:** informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

"NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE."

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


CINTILAN[®] tem como princípio ativo o piracetam, precursor de uma nova classe de fármacos originais e sem sucedâneos: os neurocorticotrópicos. Age a nível dos neurônios corticais, aumentando a produção, o armazenamento e a mobilização de ATP (trifosfato de adenosina), substância indispensável ao metabolismo das células nervosas.

Além de facilitar a comunicação entre os hemisférios cerebrais, da qual dependem os processos de aprendizagem e memorização, o piracetam exerce uma influência favorável sobre a capacidade intelectual e relacionamento.

INDICAÇÕES

Perturbações da memória, atenção, concentração, julgamento e raciocínio; desvios de comportamento e dificuldade de adaptação; síndromes involutivas senis; alcoolismo e toxicomanias; seqüelas de afecções neurológicas de origem traumática, infecciosa e acidentes vasculares cerebrais.

BU0159/A



CONTRA-INDICAÇÕES

CINTILAN® é contra-indicado em pacientes com conhecida hipersensibilidade ao piracetam e naqueles com insuficiência renal grave. Como regra geral, deve-se evitar a utilização de medicamentos durante o primeiro trimestre da gravidez. Durante o período restante os benefícios e riscos decorrentes de seu emprego devem ser cuidadosamente avaliados.

EFEITOS COLATERAIS

Na posologia recomendada, o produto é bem tolerado e geralmente não dá origem a efeitos secundários; podem ocorrer, raramente, quadros de agitação, nervosismo, distúrbios do sono, distúrbios gastrointestinais, tais como náuseas, vômitos, diarreia e gastralgias.

POSOLOGIA

Cápsulas - no início do tratamento, recomenda-se a administração de 2 cápsulas 3 vezes ao dia. Após a obtenção do efeito desejado, reduzir a dose progressivamente para 1 cápsula 3 vezes ao dia.

Injetável - administrar 1 ampola 3 vezes ao dia, por via intramuscular ou endovenosa.

Solução oral - no início do tratamento recomendam-se 60 mg (1 ml de solução) por kg de peso ao dia, divididos em 2 ou 3 administrações. Após a obtenção dos efeitos desejados, reduzir as doses para 30 mg por kg de peso/dia, dividido em 2 ou 3 administrações.

O copo-medida que acompanha o frasco tem quatro graduações: 2,5 - 5,0 - 7,5 e 10 ml para facilitar o fracionamento das doses.

Observações: tanto por via oral ou parenteral, a posologia pode ser modificada, a critério médico, de acordo com a natureza e a gravidade de cada caso em particular.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

Data de fabricação, prazo de validade e nº do lote: vide cartucho.

Farm. Resp.: Dra. Clarice Mitie Sano Yui

CRF-SP nº 5.115

MS - 1.0181.0266

Medley.

Medley S.A. Indústria Farmacêutica
Rua Macedo Costa, 55 - Campinas - SP
CNPJ 50.929.710/0001-79
Indústria Brasileira

