

**Clenil® Compositum Spray JET**  
**dipropionato de beclometasona**  
**salbutamol**

**Forma Farmacêutica e Apresentação:**

Aerossol doseado: recipiente com bocal para 200 doses. Acompanha espaçador **JET®**.

**USO ADULTO E PEDIÁTRICO**

**Fórmula:**

Cada dose (jato) contém:

Dipropionato de beclometasona .....50 mcg

Salbutamol .....100 mcg

Excipientes: trioleato de sorbitana , lecitina de soja, triclorofluorometano, diclorodifluorometano.

**INFORMAÇÃO AO PACIENTE**

Guarde o medicamento em temperatura ambiente (15°C a 30°). A lata de **Clenil® Compositum** é pressurizada; não tentar furá-la, quebrá-la ou queimá-la mesmo quando vazia. Não expor a fontes de calor. Nunca use remédios após prazo de validade impresso na caixa. **O prazo de validade** é de 36 meses. **Clenil® Compositum** é indicado tanto para tratamento quanto para prevenção das crises asmáticas; sua ação já se faz notar logo após a primeira dose, que poderá ser ajustada pelo médico. O salbutamol tem ação exclusivamente nas vias respiratórias. Portanto, não tem efeitos como batedeira, por exemplo, produzidos por outros produtos. A beclometasona é um corticóide que, se usado nas doses recomendadas pelo seu médico, não tem ação maléfica sobre o organismo, só agindo na vias respiratórias. No caso de gravidez, informe seu médico. O tratamento com **Clenil® Compositum** não deverá ser interrompido sem o conhecimento do médico, pois poderá haver piora do quadro.

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. NÃO TOME REMÉDIO SEM CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, POIS PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.**

**INFORMAÇÃO TÉCNICA**

**Clenil® Compositum** é uma associação de broncodilatador, o salbutamol , com um corticosteróide de ação tópica, o dipropionato de beclometasona. O salbutamol é caracterizado por uma rápida e segura ação anti-espasmódica brônquica, que determina uma pronta melhora da função respiratória. A ação do salbutamol se dá efetivamente na musculatura brônquica, sem provocar efeito cardiocirculatório indesejável.

De outra parte, o dipropionato de beclometasona controla a hiper-atividade brônquica, reduzindo o edema e a hipersecreção, inibindo progressivamente o surgimento do broncoespasmo. Portanto, os dois princípios ativos se completam e se potencializam.

A atividade do dipropionato de beclometasona é limitada ao nível da árvore brônquica sem causar efeito geral e, portanto, sem inibir a função supra-renal. A fim de obter pleno sucesso terapêutico, é importante que o paciente siga atentamente a instrução de uso e aprenda a inalar corretamente o medicamento.

**Indicações:**

Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, acompanhadas de broncoespasmo, assim como para a prevenção e tratamento da asma brônquica e demais condições de broncoestenose.

**Contra-Indicações:**

Deve-se evitar o uso do produto em pacientes com tuberculose pulmonar.


**Precauções:**

Durante a gravidez e lactação o produto só deverá ser administrado em caso de necessidade premente e sob rígido controle médico. O uso prolongado poderá permitir a instalação de monilíase orofaríngea, que poderá ser tratada normalmente com alcalinizantes ou antimicóticos locais, sem a interrupção do tratamento.

**Posologia:**

Será ajustada pelo médico em cada caso, sendo indicada uma posologia normal de 2 a 4 doses ao dia, que poderá ser elevada até 4 a 6 doses ao dia durante um período de até 10 dias.

Para permitir a aplicação do medicamento **Clenil® Compositum** é necessário à utilização de um dispositivo. Há disponível dois tipos: bucal ou dispositivo Jet. Verifique com o seu médico qual o mais indicado pra você.

**Instruções de uso do Dispositivo em L (bocal):**

1- Tirar a tampa de proteção;



2- Segurar em posição vertical, com o bocal para baixo como indicado na figura;




3- Agitar energicamente, sem apertar;



4- Fazer uma expiração completa e colocar o bocal entre os lábios bem fechados;



5- Inspirar demorada e profundamente, somente com a boca e simultaneamente apertar uma só vez. Segurar a respiração o maior tempo possível;




6- Terminada a inalação, fechar o bocal com a tampa de proteção. O bocal deve estar sempre limpo. A limpeza deve ser efetuada com água morna, após ter extraído a “bombinha”.

## Instruções de uso do dispositivo Jet:

1. Encaixar o frasco no dispositivo;



2. Retirar a tampa protetora;



3. Agitar vigorosamente;



4. Expirar completamente e introduzir a extremidade do dispositivo **JET**<sup>®</sup> na boca;



5. Acionar o aerossol apenas uma vez, inspirar e reter o ar por alguns segundos após a inalação. Se o seu médico indicou uma posologia superior a uma administração, repita o procedimento;



6. Recolocar a tampa de proteção no dispositivo **JET**



O dispositivo **JET**<sup>®</sup> foi desenvolvido exclusivamente para os aerossóis da **Farmalab Chiesi**. A utilização de aerossóis diferentes daqueles mencionados anteriormente, resultarão em problemas de adaptação da válvula ao dispositivo **JET**<sup>®</sup>, o que causará a perda do produto e diminuição da eficácia em função da não precisão das doses administradas.

Dispositivo JET proporciona uma maior facilidade na aplicação, principalmente para pacientes idosos e crianças, facilitando também a deposição das partículas do medicamento nos pulmões.

## **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA**

**Lote, Data de Fabricação e Validade: VIDE CARTUCHO.**

---



**FARMALAB Indústrias Químicas e Farmacêuticas Ltda.**

**Uma empresa do Grupo Chiesi Farmaceutici SpA.**

Rua Dr. Giacomo Chiesi, nº 151 – Estrada dos Romeiros Km 39,2

Santana de Parnaíba – SP

CNPJ 61.363.032/0001-46 – ® Marca Registrada – Indústria Brasileira

Reg. MS nº 1.0058.0077

Farmacêutica Responsável: C.M.H. Nakazaki - CRF-SP nº 12.448

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): 0800 11 45 25

[www.chiesibrasil.com.br](http://www.chiesibrasil.com.br)