

**CLUSIVOL® COMPOSTO**  
polivitamínico, polimineral e lisina

**Nome comercial:** Clusivol® Composto

**Nome genérico:** polivitamínico, polimineral e lisina

Xarope

**Forma farmacêutica e apresentação comercializada referente a essa bula:**

Clusivol® Composto: frasco com 240mL.

Acompanha copo-medida graduado.

Uso oral

USO PEDIÁTRICO E ADULTO

**Leia sempre a bula. Ela traz informações importantes e atualizadas sobre o seu medicamento.**

**Composição:**

Cada 1mL contém	%*			
	Crianças			Adultos
	1-3 anos	4-6 anos	7-10 anos	
	5mL	5mL	10mL	20mL

**VITAMINAS**

vitamina A	(como palmitato de retinol)	250UI	94	83	150	250
vitamina B1	(como cloridrato de tiamina)	0,07mg	70	58	78	117
vitamina B2	(como fosfato sódico de riboflavina)	0,09mg	90	75	100	138
vitamina B6	(como cloridrato de piridoxina)	0,08mg	80	80	80	123
vitamina B12	(cianocobalamina)	0,3mcg	167	125	167	250
vitamina C	(ácido ascórbico)	3,25mg	54	54	93	144
vitamina D3	(colecalfiferol)	20UI	50	50	100	200
colina	(como hemitartrato de colina)	0,43mg	1	0,86	2	2
dexpantenol	(como pantotenato de cálcio)	0,6mg	150	100	150	240
inositol		0,5mg	**	**	**	**
nicotinamida		1mg	83	62,5	83	125

**AMINOÁCIDO**

lisina	(como cloridrato de lisina)	2,0mg	**	**	**	**
--------	-----------------------------	-------	----	----	----	----

**SAIS MINERAIS**

cálcio	(como lactato de cálcio)	4mg	4	3	6	8
ferro	(como gliconato ferroso)	0,3mg	25	25	33	43
fósforo	(como hipofosfito de cálcio)	3mg	3	3	2	9
iodo	(como iodeto de potássio)	7,5mcg	50	34	75	115
magnésio	(como gliconato de magnésio)	0,3mg	2,5	2	3	2
manganês	(como gliconato de manganês)	0,05mg	21	17	33	43
potássio	(como gliconato de potássio)	0,25mg	**	**	**	**
zinco	(como lactato de zinco)	0,05mg	6	5	9	14

\*%: Teor percentual do componente, na posologia indicada conforme as faixas etárias, relativo à ingestão mínima diária recomendada.

\*\* : Não estabelecido.

*Veículos: ácido cítrico anidro, ácido láctico, aroma cítrico composto, butilidroxianisol, butilidroxitolueno, cisteína, corante caramelo, açúcar líquido, dextrose anidra, glicerol, metilparabeno, propilparabeno, sacarina sódica, goma xantana, óleo de mamona, óleo de milho, manitol e água.*

## **INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

### **Como este medicamento funciona?**

Clusivol<sup>®</sup> Composto é um suplemento de vitaminas, minerais e lisina, por esta razão, todos e cada um dos elementos de sua fórmula não tem por finalidade efeitos terapêuticos. Quando tomado regularmente, cada um dos ingredientes de sua fórmula tem por objetivo suprir as prováveis deficiências de nutrientes que a dieta ou outras condições biológicas podem originar.

Clusivol<sup>®</sup> Composto, além de reunir todos esses elementos essenciais, possui sabor agradável, o que facilita sua administração às crianças.

### **Por que este medicamento foi indicado?**

Clusivol<sup>®</sup> Composto está indicado como suplemento de vitaminas, minerais e lisina nos seguintes casos:

- para lactentes e crianças em fase de crescimento;
- em dietas restritivas e inadequadas;
- na prevenção do raquitismo;
- na prevenção da cegueira noturna e xeroftalmia;
- como auxiliar do sistema imunológico;
- em doenças crônicas ou convalescença e
- no pós-cirúrgico.

### **Quando não devo usar este medicamento?**

Clusivol<sup>®</sup> Composto não deve ser utilizado por pessoas com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula.

**ATENÇÃO: ESTE MEDICAMENTO CONTÉM AÇÚCAR, PORTANTO DEVE SER USADO COM CAUTELA EM PORTADORES DE DIABETES.**

**ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MULHERES GRÁVIDAS OU QUE POSSAM FICAR GRÁVIDAS DURANTE O TRATAMENTO.**

**NÃO HÁ CONTRA-INDICAÇÃO RELATIVA A FAIXAS ETÁRIAS.**

**INFORME AO MÉDICO O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS.**

### **Como devo usar este medicamento?**

Aspectos físicos e características organolépticas: líquido viscoso e opaco, marrom escuro, com odor e sabor de laranja.

Agite antes de usar.

Clusivol® Composto deve ser administrado diariamente, nas doses recomendadas, conforme tabela abaixo, em uma única tomada ou dividida em duas, preferencialmente junto às refeições. Pode ser diluído em água, chá, suco de frutas ou misturado a alimentos.

<b>Idade (anos)</b>	<b>Dose diária (mL)</b>
Lactentes	Sob orientação médica
1 a 3	2,5 a 5
4 a 6	5
7 a 11	10
Acima de 12 anos e adultos	20

Pode ser utilizado por tempo indeterminado. Não é recomendado exceder a dose diária.

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

**NÃO USE O MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ANTES DE USAR, OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO.**

**Quais os males que este medicamento pode causar?**

Ocasionalmente, podem ocorrer constipação, ligeiras cólicas abdominais, escurecimento e amolecimento das fezes, que regridem com a continuidade do tratamento. Reações de hipersensibilidade.

**O que fazer se alguém usar uma grande quantidade deste medicamento de uma só vez?**

Procure orientação de um médico ou um centro de intoxicação imediatamente.

**Onde e como devo guardar este medicamento?**

O produto deve ser mantido em sua embalagem original e em temperatura ambiente (entre 15 - 30°C).

**TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE**

**Características farmacológicas**

As vitaminas e os minerais são micronutrientes essenciais para atender às necessidades nutricionais para o crescimento e o desenvolvimento normais e manutenção da saúde. Agem como co-fatores em reações bioquímicas, participando de diversas funções metabólicas. Os aminoácidos são elementos formadores das proteínas, principais constituintes de todos os tecidos orgânicos. Os aminoácidos são incorporados diretamente ao metabolismo orgânico e suas necessidades são maiores durante a fase do crescimento. Destaca-se a lisina que atua na formação e crescimento dos ossos, favorecendo a absorção de cálcio; também ajuda na produção de alguns hormônios e enzimas, na formação do colágeno e na regeneração do tecido lesado.

### **Resultados de eficácia**

Por se tratar de um suplemento vitamínico-mineral, não há dados de eficácia disponíveis.

### **Indicações**

Clusivol® Composto está indicado como suplemento de vitaminas, minerais e lisina nos seguintes casos:

- para lactentes e crianças em fase de crescimento;
- em dietas restritivas e inadequadas;
- na prevenção do raquitismo;
- na prevenção da cegueira noturna e xeroftalmia;
- como auxiliar do sistema imunológico;
- em doenças crônicas ou convalescença e
- no pós-cirúrgico.

### **Contra-indicação**

Clusivol® Composto não deve ser utilizado por pessoas com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula.

### **Modo de usar e cuidados de conservação depois de aberto**

Agite antes de usar. Clusivol® Composto deve ser administrado diariamente nas doses recomendadas conforme tabela abaixo, em uma única tomada ou dividida em duas, preferencialmente junto às refeições. Pode ser diluído em água, chá, suco de frutas ou misturado a alimentos.

Depois de aberto o produto deve ser mantido em sua embalagem original e em temperatura ambiente (entre 15 - 30°C).

### **Posologia**

<b>Idade (anos)</b>	<b>Dose diária (mL)</b>
1 a 3	2,5 a 5
4 a 6	5
7 a 11	10
Acima de 12 anos e adultos	20

Estas doses poderão ser alteradas conforme orientação médica.

### **Advertências**

ATENÇÃO: ESTE MEDICAMENTO CONTÉM AÇÚCAR, PORTANTO, DEVE SER USADO COM CAUTELA EM PORTADORES DE DIABETES.

ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MULHERES GRÁVIDAS OU QUE POSSAM FICAR GRÁVIDAS DURANTE O TRATAMENTO.

### **Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco**

Não há relatos de intercorrências até o momento com o uso do produto por idosos e crianças. Pode ser necessária a redução da dose do suplemento nos casos de insuficiência renal ou hepática graves.

### **Interações medicamentosas**

Os suplementos de vitaminas e minerais não são isentos de interações medicamentosas. Recomenda-se avaliação cuidadosa ao prescrever outro medicamento a usuários deste tipo de suplemento.

### **Reações adversas a medicamentos**

Ocasionalmente, podem ocorrer constipação, ligeiras cólicas abdominais, escurecimento e amolecimento das fezes, que regredem com a continuidade do tratamento. Reações de hipersensibilidade.

### **Superdose**

Em casos de ingestão acidental de doses muito acima das preconizadas, recomenda-se adotar medidas habituais de controle das funções vitais.

### **Armazenagem**

O produto deve ser mantido em sua embalagem original e em temperatura ambiente (entre 15 - 30°C).

MS nº1.2110.0054

Farm. Resp.: Edina S. M. Nakamura - CRF - SP nº 9258

Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda.

Rodovia Castelo Branco Km 32,5 - Itapevi – São Paulo – Brasil

CNPJ nº 61.072.393/0039-06



05.07