

Deltacid®

deltametrina

Loção e Shampoo

FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES

Loção: frascos com 100 mL

Shampoo: frascos com 100 mL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÕES

LOÇÃO

Cada 100 mL de loção contém:

Deltametrina 20 mg
Veículo: nonilfenol etoxilado, colônia, butilhidroxitolueno, álcool etílico, ácido sórbico, hidróxido de sódio, ciclohexanona, fenilsulfonato de cálcio e água purificada q.s.p. 100 mL

SHAMPOO

Cada 100 mL de shampoo contém:

Deltametrina 20 mg
Veículo: nonilfenol etoxilado, lauril éter sulfato de sódio, dietanolamina de ácido graxo de côco, colônia, butilhidroxitolueno, metilparabeno, propilparabeno, álcool etílico, cloreto de sódio, ácido cítrico monoidratado, fosfato dissódico dodecaidratado, ciclohexanona, fenilsulfonato de cálcio, corante tartrazina (amarelo FD&C nº 5): vide item "Precauções e Advertências", água purificada q.s.p. 100 mL

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Ação esperada do medicamento: DELTACID® está indicado no tratamento e profilaxia da pediculose (piolhos), da escabiose (sarna) e das infestações por carrapatos em geral.

Cuidados de armazenamento/Prazo de validade: o produto deverá ser mantido em temperatura ambiente (15°C a 30°C) e protegido da luz. DELTACID® Loção e Shampoo têm validade de 24 meses após a data de fabricação, não devendo ser utilizados após o vencimento do prazo.

Gravidez e lactação: não se conhecem riscos do uso de DELTACID® durante a (ou na suspeita de) gravidez e durante o aleitamento materno. Contudo, informe seu médico sobre a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando.

Cuidados de administração/Interrupção do tratamento: é importante informar ao médico caso apresente qualquer tipo de doença, principalmente asma, alergias ou lesões da pele (feridas ou queimaduras).

Não usar DELTACID® para tratamento das sobrancelhas ou cílios. No caso de contato com os olhos, lavá-los por cerca de 15 minutos em água corrente e procurar orientação médica.

Evitar a contaminação de alimentos pelo produto.

Não reutilizar o recipiente vazio.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Deve-se tomar cuidado ao aplicar DELTACID® próximo às cavidades naturais (olhos, boca, nariz, orelhas, genitais e ânus) para que não haja risco de absorção inadvertida pelas mucosas ou irritação local. Para se evitar o risco de inalação da substância, aplicar DELTACID® em ambiente ventilado, observando os procedimentos recomendados no item "Modo de Usar".

Devido à fácil transmissão da parasitose aos contactantes (familiares, parceiros sexuais), aconselha-se a pesquisa e tratamento dos outros afetados pelo mesmo agente.

Não há cuidados a serem tomados para a interrupção do tratamento com DELTACID®, contudo não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Reações adversas: DELTACID® pode causar irritação ocular e da pele.

Informe seu médico sobre o aparecimento de reações desagradáveis.

"TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS".

Contra-indicações e precauções: informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

Como normas gerais de higiene, recomenda-se:

- Ferver a roupa de cama e de uso pessoal, mantendo-as limpas;
- Manter as unhas curtas e limpas. No caso de pediculose (piolhos) manter os cabelos curtos e limpos;
- Procurar descobrir possíveis portadores e possíveis contatos com eles e seus objetos de uso;
- Alertar os responsáveis por instituições coletivas freqüentadas pelo portador do parasita, principalmente escolas e creches.

"NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DE SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE".

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PROPRIEDADES

A deltametrina é a substância mais ativa da classe dos piretróides, substância sintética obtida por esterificação do ácido crisantêmico, extraído da flor do crisântemo (*Chrysanthemum cinerariaefolium*). A deltametrina apresenta elevado coeficiente de segurança e baixa toxicidade para mamíferos. Possui considerável efeito residual e alto poder letal contra piolhos e ácaros. A deltametrina apresenta notáveis propriedades pediculicidas e escabicidas sendo o *Pediculus humanus capitis*, *Pediculus humanus humanus*, *Phthirus pubis* e seus ovos extraordinariamente sensíveis à sua ação. A sua ação é seletiva e se dá após a absorção da substância através do exoesqueleto de quitina dos ectoparasitas. Uma vez no interior do organismo do inseto, a deltametrina transportada pela hemolinfa, fixa-se nos gânglios nervosos periféricos e nas estruturas motoras do Sistema Nervoso Central, produzindo excitabilidade, incoordenação motora, paralisia, letargia e morte do parasita.



INDICAÇÕES

DELTACID® está indicado no tratamento e profilaxia da pediculose (piolhos), da escabiose (sarna) e das infestações por carrapatos em geral.

CONTRA-INDICAÇÕES

Hipersensibilidade à deltametrina.

Alergia respiratória.

Lesões de pele: feridas e queimaduras ou condições que possibilitem maior absorção.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

DELTACID® está indicado somente para uso tópico.

Não deve ser ingerido ou inalado.

Deve ser mantido fora do alcance dos olhos e mucosas.

No caso de contato accidental com os olhos, lavá-los imediatamente com água corrente por alguns minutos.

No caso de infecção ou irritação da pele, interromper o tratamento.

Aviso referente à apresentação shampoo: "ESTE PRODUTO CONTÉM O CORANTE AMARELO DE TARTRAZINA QUE PODE CAUSAR REAÇÕES DE NATUREZA ALÉRGICA, ENTRE AS QUAIS ASMA BRÔNQUICA, ESPECIALMENTE EM PESSOAS ALÉRGICAS AO ÁCIDO ACETILSALICÍLICO."

Gravidez e lactação

Desconhecem-se efeitos adversos pelo uso de DELTACID® na gravidez ou lactação.

Contudo deve-se considerar o risco-benefício antes da indicação.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Ainda não foram descritas interações medicamentosas com DELTACID®.

REAÇÕES ADVERSAS

Podem ocorrer irritação cutânea, ocular e reações de hipersensibilidade, sobretudo do tipo alergia respiratória.

No caso do uso em pele lesada por feridas ou queimaduras, pode ocorrer maior absorção da deltametrina com efeitos gastrintestinais e neurológicos agudos.

MODO DE USAR - EXTERNO

Antes do tratamento, fazer a limpeza e fervura das roupas e objetos de uso pessoal (principalmente pentes e escovas para o cabelo) do paciente e contactantes, para evitar a reinfestação após a aplicação.

DELTACID® LOÇÃO

Pediculose: deve ser aplicado nas áreas atingidas, de preferência durante o banho, fazendo-se ligeiras fricções com a ponta dos dedos.

Deixar as áreas atingidas ensaboadas durante 5 minutos. Enxaguar bem.

Escabiose: friccionar toda a região afetada ou todo o corpo caso necessário, deixando permanecer até o próximo banho.

Em ambos os casos, usar por 4 dias consecutivos.

DELTACID® SHAMPOO

Deve ser aplicado nas áreas atingidas, de preferência durante o banho, fazendo-se ligeiras fricções com a ponta dos dedos.

Deixar as áreas atingidas ensaboadas durante 5 minutos. Enxaguar bem. Usar durante 4 dias consecutivos.

Sob todas as formas o esquema de tratamento deve ser repetido 7 dias após a última aplicação devido à possível reinfestação por permanência de ovos.

CONDUTA NA SUPERDOSAGEM

No caso de ingestão accidental, o tratamento é principalmente de suporte. Deve-se induzir vômito nos indivíduos conscientes ou realizar lavagem gástrica nos inconscientes. Pode-se administrar sais catárticos para aumentar o trânsito intestinal e diminuir a absorção intestinal da piretrina.

No caso de inalação accidental, pode-se necessitar de respiração artificial.

PACIENTES IDOSOS

Até o momento não há evidência que sugira que a resposta deste grupo etário seja diferente daquela apresentada por pacientes mais jovens.

Reg. MS-1.0082.0069

Farm. Resp.: Dr. Rogério M. Massonetto - CRF-SP nº 22.965

"SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA."

Nº de lote, data de fabricação e data de validade: vide cartucho e/ou rótulo.



**Solvay
Farma**

SOLVAY FARMA LTDA.

Rua Salvador Branco de Andrade, 93
Taboão da Serra - SP - Indústria Brasileira
CNPJ: 60.499.639/0001-95

SAC
0800-0141500
www.solvayfarma.com.br

1036757