

# Dermicon



ácido benzóico  
ácido salicílico  
iôdo metálico

---

---

## FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO:

Solução Tópica: Frascos com 60 ml.

## USO EXTERNO

## COMPOSIÇÃO:

Cada 1 ml contém:

Ácido benzóico.....	20,0 mg
Ácido salicílico.....	20,0 mg
Iôdo metálico.....	2,5 mg
Licor de Hoffman.....q.s.p.....	1,0 ml

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

- O uso de Dermicon é tópico.
- O prazo de validade encontra-se gravado na embalagem externa e no frasco, em caso de vencimento, inutilize o produto.
- Este produto deve ser armazenado a temperatura ambiente, em local isento de calor excessivo, proteger o medicamento da luz.
- Dermicon apresenta em sua fórmula substâncias fungicidas e bacteriostáticas, para eficaz tratamento das micoses muito difundidas em países de clima tropical como o Brasil.
- Informe seu médico a ocorrência de gravidez durante o tratamento.

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

**NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DE SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.**

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Dermicon apresenta em sua formulação o ácido benzóico, ácido salicílico, iôdo metálico, álcool e éter etílico que em associação apresentam ação fungistática, fungicida e antisséptica, atuando no tratamento das infecções micóticas da pele.

## INDICAÇÕES:

Medicação antimicótica.

## **CONTRA-INDICAÇÕES:**

---

Nos casos de hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

## **PRECAUÇÕES:**

---

Não aplicar em partes sensíveis do corpo e regiões de mucosas.

Dermicon deve ser administrado com cautela e supervisão médica em pacientes que apresentem lesões ou escoriações na pele que possibilitem maior absorção.

**Pacientes idosos:** Não existem advertências ou recomendações especiais sobre o uso do produto por pacientes idosos.

## **REAÇÕES ADVERSAS:**

---

Podem ocorrer reações de hipersensibilidade aos componentes ativos do produto.

## **GRAVIDEZ:**

---

Informe seu médico a ocorrência de gravidez durante o tratamento.

## **POSOLOGIA:**

---

Uso tópico externo.

Embeber um algodão com a solução e passar três vezes ao dia sobre as partes afetadas.

Nas crianças a aplicação deve ser feita sob orientação médica.

## **SUPERDOSAGEM:**

---

Nas doses recomendadas não há registro de superdosagem.

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

---

---

Reg. M.S.nº 1.0577.0035.001-6

Farm.Responsável: Dra. Elaine C.M.Pessôa - CRF-SP nº 14.059



**BUNKER**

**BUNKER INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA**

Rua: Aníbal dos Anjos Carvalho, 212 Cidade Dutra

São Paulo - SP - Fone: (11) 5666-0266

C.N.P.J. 47.100.862/0001-50

Serviço de Atendimento ao Cliente: **SAC 0800.142110**

INDÚSTRIA BRASILEIRA