

dexafenicol®

dexametasona

cloranfenicol

FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES

Solução oftálmica: frasco plástico conta-gotas contendo 5 ml de solução oftálmica estéril.

Pomada oftálmica: tubo contendo 3,5 g de pomada oftálmica estéril.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÕES

SOLUÇÃO OFTÁLMICA

Cada ml contém: 1 mg de dexametasona e 5 mg de cloranfenicol.

Veículo: ácido bórico, borato de sódio, digluconato de clorexidina, edetato dissódico, cremophor RH 40, povidona, bissulfito de sódio, creatinina e água purificada q.s.p.

POMADA OFTÁLMICA

Cada g contém: 0,5 mg de dexametasona e 5 mg de cloranfenicol.

Veículo: polissorbato 80, vaselina sólida, vaselina líquida, lanolina, edetato dissódico, álcool cetílico, metilparabeno e cera microcristalina q.s.p.

INFORMAÇÃO AO PACIENTE

- Ação esperada do medicamento: ação antiinflamatória, antialérgica e antiinfecçiosa.
- Cuidados de armazenamento: o produto deve ser armazenado a temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) e ao abrigo da luz.
- Prazo de validade: vide cartucho. Não use medicamento com prazo de validade vencido.
- Gravidez e lactação: informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se está amamentando.
- Cuidados de administração: aplique a dose recomendada, no saco conjuntival, evitando tocar a ponta do frasco ou tubo nos tecidos oculares. Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. A dosagem do medicamento deve ser reduzida pouco a pouco, conforme for melhorando a inflamação ocular.
- Interrupção do tratamento: não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
- Reações adversas: informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

- Contra-indicações e precauções: informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

NÃO USE REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE

Informação Técnica

Dexafenicol® (dexametasona, cloranfenicol) é uma associação de dexametasona e cloranfenicol, para uso em Oftalmologia, com ação antiinflamatória, antialérgica e antiinfecçiosa.

A dexametasona é um glicocorticóide, derivado fluorado da prednisolona, que age por inibição da resposta inflamatória induzida por agentes de natureza mecânica, química ou imunológica. A dexametasona elimina ou minimiza os sintomas da inflamação e alergia, tais como prurido, ardor, vasodilatação e edema.

O cloranfenicol é um antibiótico que atua por inibição da síntese protéica bacteriana. Possui amplo espectro de ação antimicrobiana e é eficaz contra germes Gram-positivos e Gram-negativos, tais como *Escherichia coli*, *Haemophilus influenzae*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus hemolyticus* e *Moraxella lacunata* (bacilo de Morax-Axenfeld).

Indicações

Nos processos agudos inflamatórios, alérgicos e infecciosos do segmento anterior do olho, quando em presença de germes sensíveis ao cloranfenicol.

Contra-indicações

Hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Infecções por Herpes simples (ceratite dendrítica), varicela, varicela e outras doenças virais da córnea e conjuntiva. Afecções micóticas e tuberculosas das estruturas oculares. Glaucoma. Doenças com adelgaçamento da córnea e esclera.

Precauções e Advertências

Em tratamentos prolongados é aconselhável o controle freqüente da pressão intra-ocular e o exame biomicroscópico da córnea e cristalino. O produto pode mascarar infecções por microrganismos não sensíveis ao cloranfenicol. Usar com precaução durante a gravidez e no período de amamentação. Em uso prolongado recomenda-se controle do hemograma. Raros casos de hipoplasia medular, inclusive anemia aplástica, foram relatados após o uso de cloranfenicol.

Interações Medicamentosas

Não são conhecidas interações com outros medicamentos

Reações Adversas

O uso prolongado pode resultar em glaucoma, formação de cataratas ou infecções secundárias por bactérias não sensíveis ou fungos. Discrasias sangüíneas. A pomada oftálmica pode retardar a cicatrização de feridas corneanas.

Posologia

Solução oftálmica: instilar 1 a 2 gotas no saco conjuntival, três vezes por dia, reduzindo-se gradativamente a posologia, com a melhora da inflamação ocular, conforme orientação do médico.

Pomada oftálmica: aplicar uma pequena quantidade no saco conjuntival inferior, três vezes por dia, reduzindo-se gradativamente a posologia, com a melhora da inflamação ocular, conforme orientação médica.

Para maior comodidade, a solução oftálmica poderá ser utilizada durante o dia, e a pomada à noite, ao deitar-se.

A administração deve ser feita sob estrita orientação médica.

Superdosagem

Em geral, superdosagens não provocam problemas agudos. Se, acidentalmente, for ingerido, beber bastante líquido para diluir, ou procurar orientação médica.

Pacientes Idosos

Não existem restrições de uso em pacientes idosos. A posologia é a mesma que a recomendada para as outras faixas etárias.

Nº de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

MS - 1.0147.0130

Farm. Resp.: Dra Maria Paula Marques
CRF-SP nº 11.682



Qualidade e Tradição a Serviço da Oftalmologia

ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
Av. Guarulhos, 3.272 - CEP 07030-000 - Guarulhos - SP

CNPJ 43.426.626/0009-24

Indústria Brasileira

® Marca Registrada

Texto adaptado à portaria 110/97

71899BR10T
Laetus: 86

Serviço de Atendimento ao Consumidor
0800-144077
Discagem Direta Gratuita

LARANJEIRA