



# Dimezin®

## simeticona



### FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

#### Comprimido 40mg

Embalagem contendo 20 comprimidos.

### USO ADULTO E PEDIÁTRICO

#### USO ORAL

### COMPOSIÇÃO

Cada comprimido contém:

simeticona.....40mg

Excipiente q.s.p.....1 comprimido

Excipientes: lactose, celulose microcristalina, croscarmelose sódica, fosfato de cálcio dibásico, dióxido de silício e estearato de magnésio.

### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

**Ação do medicamento:** Dimezin® atua no estômago e no intestino, diminuindo a tensão superficial dos líquidos digestivos, rompendo as bolhas que retêm os gases e que provocam flatulências e dores. Assim, os gases são eliminados mais facilmente, diminuindo o desconforto causado por eles.

**Indicações do medicamento:** Dimezin® é indicado para pacientes com excesso de gases no aparelho digestivo. O acúmulo de gases no estômago e no intestino chama-se flatulência, ou seja, incômodo, estufamento, dor ou cólicas no abdome. A eliminação dos gases aliviam estes sintomas.

Dimezin® também pode ser usado como medicação auxiliar em exames médicos como na endoscopia digestiva, e no preparo dos pacientes para radiografia do abdome.

**Riscos do medicamento:**



**CONTRAINDICAÇÕES:** DIMEZIN® NÃO DEVE SER UTILIZADO POR PESSOAS ALÉRGICAS OU SENSÍVEIS A QUALQUER UM DOS COMPONENTES DA FÓRMULA.

**ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:** COMO O DIMEZIN® É BEM TOLERADO, NÃO HÁ ADVERTÊNCIAS OU RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS SOBRE O SEU USO.

**Interações medicamentosas:** Não são conhecidas interações de Dimezin® com outros medicamentos ou alimentos.

Não há recomendações especiais para pacientes idosos e crianças.

**Não deve ser utilizado durante a gravidez e a amamentação, exceto sob orientação médica.**

**Informe a seu médico ou cirurgião-dentista se ocorrer gravidez ou iniciar amamentação durante o uso deste medicamento.**

**Não há contraindicação relativa a faixas etárias.**

**Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Modo de uso:** Você deve engolir o comprimido com um pouco de água.

**Aspecto físico:** Comprimido circular de cor branca.

**Características Organolépticas:** Os comprimidos de Dimezin®, não apresentam características organolépticas marcantes que permitam sua diferenciação em relação a outros comprimidos.

**Posologia:** Tomar 1 comprimido 3 vezes ao dia, às refeições. Essa dose poderá ser aumentada à critério médico.

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE SEU CIRURGIÃO-DENTISTA.**

**Prazo de validade:** 24 meses a partir da data de



fabricação (VIDE CARTUCHO).

**Não use o medicamento com prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.**

**REAÇÕES ADVERSAS:** A SIMETICONA NÃO ENTRA NO ORGANISMO, ATUANDO SOMENTE DENTRO DO APARELHO DIGESTIVO, E É TOTALMENTE ELIMINADA NAS FEZES, SEM ALTERAÇÕES. DESSA MANEIRA, NÃO COSTUMA PROVOCAR REAÇÕES INDESEJÁVEIS NO ORGANISMO. VOCÊ DEVE INFORMAR AO SEU MÉDICO O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS, OU SEJA, EFEITOS DIFERENTES DO ESPERADO.

**Conduta em caso de superdose:** Não se espera que ocorram sintomas causados pelo uso exagerado de simeticona, pois este medicamento não entra no organismo.

Caso você, acidentalmente, use Dimezin® em uma quantidade maior do que a recomendada, você deve procurar um médico imediatamente.

**Cuidados de conservação e uso:** DURANTE O CONSUMO ESTE PRODUTO DEVE SER MANTIDO NO CARTUCHO DE CARTOLINA, CONSERVADO EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C). PROTEGER DA LUZ E UMIDADE.

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

**Características farmacológicas:** Dimezin®, que é a simeticona, é um silicone antiespumante, que apresenta ação antifatulenta, aliviando o mal-estar gástrico causado pelo excesso de gases.

Um dos problemas mais comuns enfrentados pelos médicos na prática diária é o das queixas sobre excessos de gases intestinais e a distensão abdominal por eles causada, devido à aerofagia.



Sob a forma de gotas, Dimezin® torna-se valioso no tratamento das cólicas intestinais dos lactentes. Também sob essa forma torna-se fácil a administração aos pacientes acamados no pós-operatório.

Dimezin® atua no estômago e no intestino, diminuindo a tensão superficial dos líquidos digestivos, levando ao rompimento das bolhas que retêm os gases. Uma vez livres os gases são facilmente eliminados por eructações ou flatos.

**Resultados de eficácia:** *Utilização da simeticona na prevenção do desconforto abdominal pós-operatório:* Um estudo duplo cego foi realizado em pacientes com secção cesariana para estudar o efeito da simeticona sobre os sinais subjetivos e objetivos de distensão por gás durante o período pós-operatório. Os resultados obtidos com a simeticona demonstraram uma redução significativamente alta das reclamações subjetivas analisadas (náusea, vômitos, meteorismo, desconforto no estômago, dores abdominais) assim como movimentos peristálticos e flatulência em relação ao placebo.

Com base nos resultados obtidos e considerando a não-toxicidade da droga, sua característica de ser inerte quimicamente, boa tolerância e uso simples, os autores consideraram a simeticona muito útil na prevenção da terapia do desconforto pós-operatório devido ao acúmulo de gás e distinção gastrointestinal após secção cesariana.

**Eficácia da simeticona na melhora da visibilidade durante a colonoscopia:** A solução oral de fosfato de sódio é melhor tolerada do que o polietilenoglicol na preparação dos pacientes para colonoscopia, entretanto, a visibilidade do lúmen é prejudicada devido a presença de bolhas.

Os resultados demonstraram que trinta pacientes no grupo placebo e apenas um no grupo da

simeticona apresentaram bolhas significativas ( 1). Adicionalmente, a contagem média de bolhas foram maiores no grupo placebo em cada região do cólon. O estudo indicou que a administração de simeticona com preparação oral de fosfato de sódio pode melhorar a visibilidade do cólon diminuindo a presença de bolhas. O aumento da qualidade na visualização do cólon pode melhorar a detecção de lesões patológicas.

**Indicações:** Dimezin® está indicado no caso de excesso de gases no aparelho gastrointestinal constituindo incômodo, motivo de dores ou cólicas intestinais, tais como: meteorismo, eructação, borborigmos, aerofagia, pós-operatório e convalescença, distúrbios fermentativos intestinais. É indicado ainda no preparo intestinal dos pacientes para radiografia do abdome para reduzir o número de bolhas no trato gastrointestinal e sombras. Similarmente, a preparação para colonoscopia e gastroscopia envolve a administração de simeticona, que, por sua ação antiespumante, melhora a visibilidade, como resultado da redução da presença de bolhas no cólon que podem dificultar a detecção de lesões na mucosa do trato gastrointestinal.

**CONTRAINDICAÇÕES:** DIMEZIN® É CONTRAINDICADO PARA PACIENTES COM HIPERSENSIBILIDADE A QUALQUER UM DOS COMPONENTES DA FÓRMULA.

**Modo de usar e cuidados de conservação depois de aberto:** Você deve engolir o comprimido com um pouco de água.

DURANTE O CONSUMO ESTE PRODUTO DEVE SER MANTIDO NO CARTUCHO DE CARTOLINA, CONSERVADO EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C). PROTEGER DA LUZ E UMIDADE.

**Posologia:** Tomar 1 comprimido 3 vezes ao dia, às refeições. Essa dose poderá ser aumentada à

critério médico.

**ADVERTÊNCIAS:** NÃO HÁ ADVERTÊNCIAS OU RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS SOBRE O USO DE DIMEZIN®.

**Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco:** Não há recomendações especiais para pacientes idosos e crianças.

**Interações medicamentosas:** Não são conhecidas interações de Dimezin® com outros medicamentos ou alimentos.

**REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS:** DIMEZIN® É FISIOLÓGICAMENTE INERTE E DESPROVIDO DE TOXICIDADE. APÓS ADMINISTRAÇÃO ORAL, A SIMETICONA É ELIMINADA PELAS FEZES DE FORMA INALTERADA.

**Superdose:** Não se espera que ocorram sintomas consequentes da superdose de simeticona, pois este fármaco não é absorvido. Entretanto, caso ocorra ingestão acidental excessiva, consulte um médico.

**Armazenagem:** DURANTE O CONSUMO ESTE PRODUTO DEVE SER MANTIDO NO CARTUCHO DE CARTOLINA, CONSERVADO EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C).

Nº do lote e data de fabricação: VIDE CARTUCHO

Farm. Resp.: Andreia Cavalcante Silva

CRF-GO nº 2.659

M.S. nº 1.0370.0208

LABORATÓRIO

**TEUTO BRASILEIRO S/A.**

CNPJ - 17.159.229/0001-76

VP 7-D Módulo 11 Qd. 13 - DAIA

CEP 75132-140 - Anápolis - GO

Indústria Brasileira

