

ENJOY

maleato de mepiramina 15,0mg • hidróxido de alumínio 150,0mg
ácido acetilsalicílico 150,0mg • cafeína 50,0mg



FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Embalagem contendo 50 strips com 4 comprimidos.

USO ADULTO

Via Oral

Embalagem Múltipla.

COMPOSIÇÃO:

Cada comprimido contém:

maleato de mepiramina.....	15,00mg
hidróxido de alumínio.....	150,00mg
ácido acetilsalicílico.....	150,00mg
cafeína.....	50,00mg
Excipientes q.s.p.....	1 comprimido

Excipientes: amido de milho, estearato de magnésio, lactose, dióxido silício coloidal e água purificada.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

AÇÃO ESPERADA DO MEDICAMENTO:

O produto é uma associação medicamentosa, que combina a ação analgésica de ácido acetilsalicílico, e a leve ação estimulante da cafeína, com a atividade anti-histamínica/antiemética do maleato de mepiramina, contando ainda com a ação antiácida do hidróxido de alumínio. Seu médico é a pessoa adequada para dar-lhe mais informações sobre o tratamento; siga sempre suas orientações. Não devem ser utilizadas doses superiores às recomendadas. A interrupção repentina deste medicamento não causa efeitos desagradáveis, nem risco, apenas cessará o efeito terapêutico.

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

ENJOY é um medicamento de ação antiálgica, analgésica e antiemética.

POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

ENJOY deve ser usado para dores de cabeça, enjôos, cinetose e sintomas alérgicos.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

CONTRA-INDICAÇÃO

ENJOY é contra-indicado a pacientes com história de hipersensibilidade aos componentes da fórmula e contra-indicado para crianças.

PRAZO DE VALIDADE: VIDE DISPLAY/ENVELOPE

Ao comprar qualquer medicamento, verifique o prazo de validade.

Atenção: não use remédio com prazo de validade vencido. Além de não obter o efeito desejado, você poderá prejudicar sua saúde.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

- ácido acetilsalicílico: potencializa os efeitos das sulfoniluréias, penicilina, tiroxina, triiodotironina, fenitoína, naproxeno, anticoagulantes orais e probenecida; aumenta a nefrotoxicidade do paracetamol; aumenta o risco de hemorragias quando administrado juntamente com outros anti-inflamatórios não-esteroidais.

- cafeína: pode ocasionar aumento do metabolismo dos barbitúricos; potencialização dos efeitos inotrópicos dos beta-bloqueadores; inibição da absorção de cálcio; potencialização das reações adversas gastrintestinais quando administrada com glicocorticóides.

- maleato de mepiramina: tem o seu efeito potencializado quando administrado juntamente com álcool ou outros medicamentos com ação muscarínica, de ação depressora do SNC, e medicamentos ototóxicos (cisplatino, paromomicina, vancomicina).

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

ENJOY não deve ser utilizado durante a gravidez. A mepiramina é eliminada em pequenas concentrações no leite materno, portanto o medicamento não deve ser utilizado durante a amamentação. Não deve ser utilizado por pacientes com antecedentes de úlcera péptica, gastrite, distúrbios da coagulação, insuficiência renal crônica e paciente asmáticos.

O uso de ENJOY é exclusivo para adultos.

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez durante o tratamento ou logo após ter feito uso do medicamento. Informe também se está amamentando.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

ASPECTO FÍSICO

ENJOY é um comprimido redondo na cor branca.

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

ENJOY possui sabor e odor característicos.

Modo de Usar

Ingerir 1 comprimido de 1 a 4 vezes por dia, com água, com intervalos de pelo menos 4 horas.

Este medicamento não pode ser partido ou mastigado.

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou de seu cirurgião dentista.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

ENJOY é um medicamento bem tolerado, e, portanto, não são descritas em literatura, reações adversas para este medicamento.

Informe ao seu médico ou cirurgião dentista sobre o aparecimento de quaisquer reações desagradáveis.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTE MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?

Não foram relatados casos de superdosagem com o uso de ENJOY. Contudo, havendo ingestão excessiva acidental, suspender imediatamente o tratamento e procurar orientação médica para que seja instituída a terapêutica adequada.

ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

ENJOY deve ser mantido em sua embalagem original. Evitar calor excessivo (manter entre 15°C-30°C) proteger da luz e umidade.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS E FARMACOLÓGICAS

O Maleato de Mepiramina é um fármaco com atividade anti-histamínica, conhecido também com nome de

Maleato de Pirilamina. Os anti-histamínicos neutralizam o excesso de histamina através do mecanismo de competição. No produto ENJOY, o Maleato de Pirilamina é utilizado como componente ativo que exerce ação inibidora de espasmos (contração da musculatura lisa) que provocam náuseas e vômitos. Essas contrações são geralmente denominadas cínetses. O Hidróxido de Alumínio pertence à categoria de neutralizantes gástricos de ação local. No produto ENJOY o Hidróxido de Alumínio é utilizado como antiácido e demulgente, neutralizando a hiperacidez estomacal, bem como reduzindo eventuais efeitos irritantes da mucosa gástrica gerada pelo ácido acetilsalicílico. O Ácido Acetilsalicílico pertence ao grupo dos analgésicos antitérmicos, substâncias que atuam concomitantemente sobre o lóbulo prefrontal-tálamo óptico e seletivamente sobre o centro térmico, promovendo a diminuição da temperatura corporal em estados febris, além de promover analgesia. Sua associação com cafeína, em função de suas específicas atividades farmacológicas, resulta numa combinação de efeitos terapêuticos. A Cafeína é um fármaco psicanaléptico que atua como discreto excitante psicomotor. Tem ação como um adjuvante analgésico, associado ao Ácido Acetilsalicílico, indicado na remissão de cefaléias.

INDICAÇÃO

ENJOY é um medicamento de ação antiálgica, analgésica e antiemética.

CONTRA-INDICAÇÃO

O medicamento é contra-indicado a pacientes com história de hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

PRECAUÇÕES/ADVERTÊNCIAS

crianças ou adolescentes não devem usar esse medicamento para catapora ou sintomas gripais antes que um médico seja consultado sobre a Síndrome de Reye.

PRAZO DE VALIDADE: VIDE DISPLAY/ENVELOPE

Ao comprar qualquer medicamento, verifique o prazo de validade.

Atenção: não use remédio com prazo de validade vencido. Além de não obter o efeito desejado, você poderá prejudicar sua saúde.

ENJOY é contra-indicado para crianças.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO DEPOIS DE ABERTO

ENJOY deve ser mantido em sua embalagem original. Evitar calor excessivo (temperatura superior a 40°C) proteger da luz e umidade.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

POSOLOGIA

Ingerir 1 comprimido de 1 a 4 vezes por dia, com água, com intervalos de pelo menos 4 horas.

ADVERTÊNCIAS

Não deve ser utilizado com por pacientes com antecedentes de úlcera péptica, gastrite, distúrbios da coagulação, insuficiência renal crônica e paciente asmáticos.

USO EM IDOSOS, CRIANÇAS E OUTROS GRUPOS DE RISCO.

- Idosos: não há restrições quanto ao uso de ENJOY em pacientes idosos. Entretanto devem ser avaliadas as interações com os medicamentos de uso contínuo (ver Interações medicamentosas e advertências).

- Crianças: este medicamento é contra-indicado para crianças.

- Gravidez e lactação: este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou lactantes sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

- ácido acetilsalicílico: potencializa os efeitos das sulfoniluréias, penicilina, tiroxina, triiodotironina, fenitoína, naproxeno, anticoagulantes orais e probenecida; aumenta a nefrotoxicidade do paracetamol; aumenta o risco de hemorragias quando administrado juntamente com outros anti-inflamatórios não-esteroidais.

- cafeína: pode ocasionar aumento do metabolismo dos barbitúricos; potencialização dos efeitos inotrópicos dos beta-bloqueadores; inibição da absorção de cálcio; potencialização das reações adversas gastrintestinais quando administrada com glicocorticóides.

- maleato de mepiramina: tem o seu efeito potencializado quando administrado juntamente com álcool, outros medicamentos com ação muscarínica, de ação depressora do SNC, e medicamentos ototóxicos (cisplatino, paromomicina, vancomicina).

- hidróxido de alumínio: muitos antiácidos diminuem a biodisponibilidade das drogas. Os casos nos quais a diminuição pode ser clinicamente significativa incluem ferro, teofila, antibiótico quinolona, tetraciclina, isoniazida e cetoconazol (dissolução reduzida por aumento de pH). Há também evidências de que os antiácidos diminuem a biodisponibilidade do etambutol, de alguns agentes antimuscarínicos, de benzodiazepínicos, fenotiazinas, ranitidina, indometacina, fenitoína, nitrofurantoina, vitamina A, fluoreto, fosfato, prednisona e procainamida.

Os antiácidos relatados diminuem a biodisponibilidade do atenolol e do propranolol, mas aumentam a do metoprolol. Os antiácidos aumentam a dissolução e a absorção das formas ácidas de sulfonamidas, a taxa de absorção de levodopa e o nível sanguíneo de ácido valproico. A maioria das interações pode ser evitada, tomando-se antiácidos 2 horas antes ou após a ingestão de outros medicamentos.

REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS

ENJOY é um medicamento bem-tolerado, e, portanto, não são descritas em literatura, reações adversas para este medicamento.

SUPERDOSE

Não foram relatados casos de superdosagem com o uso do medicamento. Contudo, havendo ingestão excessiva acidental, suspender imediatamente o tratamento e procurar orientação médica para que seja instituída a terapêutica adequada.

ARMAZENAGEM

ENJOY deve ser mantido em sua embalagem original. Evitar calor excessivo (temperatura superior a 40°C) proteger da luz e umidade.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Rég. MS nº 1.0922.0116.001-0

Farm. Resp.: Paulo Antônio Pinheiro - CRF RJ 2961

PRODUTOS HERALDIS

Divisão de: H. B. Farma Laboratórios Ltda.

Av. Eugênio Borges, 950 - Arsenal.

São Gonçalo - RJ - Cep: 24751-000

CNPJ nº 28.643.633/0001-37 - Indústria Brasileira

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800-727-5222

Tel: (21) 2199-5050.

Lote, data de fabricação e validade: vide cartucho.

Cód.: 43201.

Margem de corte
Largura da Bula - 11cm x 31,5cm
Laterais: 0,5cm (direita e esquerda)
Superior e Inferior 1,0 cm
Data: 21/01/2009
Pantone 293 U.