

# Eparema®

**Peumus boldus, Rhamnus purshiana e Rheum palmatum**  
**Boldo, Cáscara Sagrada e Ruibarbo**

NYCOMED

FITOTERÁPICO

Drágeas - Solução Oral - Flaconetes

Leia com atenção, antes de usar o produto.

Formas farmacêuticas, apresentações e via de administração

Drágea. Embalagens com 20 e 120 unidades - **USO ADULTO E CRIANÇAS ACIMA DE 10 ANOS.**

Solução oral. Frascos com 50 ml e 200 ml - **USO ADULTO.**

Flaconete. Embalagens com 12 e 60 flaconetes com 10 ml - **USO ADULTO.**

Uso oral

**Composição**

**Cada drágea contém:**

Extrato mole composto de Boldo, Cáscara Sagrada e Ruibarbo ..... 125 mg

Excipiente q.s.p. .... 1030 mg

Excipientes: dióxido de silício, povidona, estearato de magnésio, gelatina, lactose, talco, celulose microcristalina, sacarose, corante amarelo tartrazina, cera de carnaúba, carbonato de cálcio, dióxido de titânio, goma laca, goma arábica e óleo de rícino.

**OBS: Cada drágea contém 0,11 g de açúcar na forma de sacarose.**

**Cada colher das de chá (5 ml) da solução oral contém:**

Extrato fluido composto de Boldo, Cáscara Sagrada e Ruibarbo ..... 1030 mg

Veículo q.s.p. .... 5,00 ml

Excipientes: sacarose, álcool etílico, glicerol, hidróxido de sódio, metilparabeno, propilparabeno, sorbitol, essência de mentoliptus, tintura de laranja amarga, sacarina sódica e água purificada.

**OBS: Cada 5 ml da solução contém 0,5 g de açúcar na forma de sacarose.**

**Cada flaconete (10 ml) contém:**

Extrato fluido composto de Boldo, Cáscara Sagrada e Ruibarbo ..... 1030 mg

Veículo q.s.p. .... 10,00 ml

Excipientes: sacarose, álcool etílico, caramelo tipo C, glicerol, hidróxido de sódio, metilparabeno, propilparabeno, sorbitol, essência de mentoliptus, tintura de laranja amarga, sacarina sódica e água purificada.

**OBS: Cada flaconete contém 1,1 g de açúcar na forma de caramelo e sacarose.**

**Concentração dos princípios ativos**

Cada drágea contém 125 mg de extrato mole composto de boldo, cáscara sagrada e ruibarbo calculado para conter 0,05 mg de boldina, 1,70 mg de compostos antraquinônicos totais e 1,30 mg de emodina.

Cada 5 ml da solução oral contém 1030 mg de extrato fluido composto de boldo, cáscara sagrada e ruibarbo calculado para conter 0,05 mg de boldina, 1,70 mg

de compostos antraquinônicos totais e 1,50 mg de emodina.

Cada flaconete (10 ml) contém 1030 mg de extrato fluido composto de boldo, cáscara sagrada e ruibarbo calculado para conter 0,05 mg de boldina, 1,70 mg de compostos antraquinônicos totais e 1,50 mg de emodina.

**Nomenclatura botânica e parte utilizada da planta**

**Boldo:** *Peumus boldus* Molina (Monimiaceae), folha.

**Cáscara Sagrada:** *Rhamnus purshiana* D.C. (Rhamnaceae), casca.

**Ruibarbo:** *Rheum palmatum* Linné (Polygonaceae), rizoma e raiz.

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

**Quando devo usar e qual é a ação esperada de Eparema®?**

Eparema® é indicado para os distúrbios do fígado e das vias biliares, pois estimula a produção e a eliminação da bile, substância que facilita a digestão de gorduras.

Eparema® também é indicado nos casos de prisão de ventre leve, porque funciona como um laxante suave, que não induz ao hábito.

Para você saber a dose adequada de Eparema®, veja o item posologia. Você pode tomar Eparema® antes, durante ou após as refeições.

Devido à presença de extratos vegetais, Eparema® pode ter seu sabor alterado ao longo do tempo, sem comprometimento do seu efeito terapêutico.

**Como devo guardar Eparema®?**

Você deve guardar o produto na embalagem original, dentro do cartucho e à temperatura ambiente (15°C a 30°C).

**Qual é o prazo de validade de Eparema®?**

O prazo de validade está impresso na embalagem externa do produto. Não use medicamento com o prazo de validade vencido, pois, além de não obter o efeito desejado, você estará prejudicando sua saúde.

**Posso usar Eparema® durante a gravidez e a amamentação?**

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao seu médico se estiver amamentando.

**Existe algum cuidado especial para usar Eparema®?**

Se você for diabético, deve conversar com o seu médico, pois o produto contém açúcar.

Caso o uso do produto esteja sendo feito sob recomendação médica, siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não existem outros cuidados especiais para você usar Eparema®.

**Posso interromper o tratamento com Eparema®?**

Sim, você pode interromper o tratamento a qualquer momento. Caso o uso do produto esteja sendo feito sob recomendação médica, não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

**Podem ocorrer reações desagradáveis com o uso de Eparema®?**

Ainda não são conhecidas reações desagradáveis com o uso do produto.

Procure orientação de um médico, caso você apresente reações desagradáveis com o uso do produto.

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

**Quando estou usando Eparema®, posso fazer uso de outras substâncias?**

Não existe nenhuma restrição quanto ao uso de bebidas e de alimentos.

**Quando eu não devo usar Eparema® e quando devo utilizá-lo com cuidado?**

Você não deve usar Eparema® se for alérgico aos componentes de sua fórmula.

Se você for diabético, deve conversar com o seu médico sobre o uso do produto.

Não existem relatos de que Eparema® interfira com a ação de outros medicamentos. Porém, você deve informar ao seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.

**Atenção diabéticos: contém açúcar.**

**Eparema® Drágeas contém o corante amarelo de tartrazina que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.**

**Riscos da automedicação: NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.**

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

**Características**

Eparema® é um produto fitoterápico, composto pelos extratos vegetais de Boldo, Cáscara Sagrada e Ruibarbo.

Os extratos vegetais associados fluidificam a bile e aceleram sua eliminação para o intestino. Adicionalmente, promovem uma branda ação laxante, evitando a constipação sem levar ao hábito nem causar danos ao trato intestinal.

Devido à presença de extratos vegetais, Eparema® pode ter seu sabor alterado ao longo do tempo, sem comprometimento do seu efeito terapêutico.

**Indicações**

Distúrbios hepato-biliares, funcionando como colágeno e colerético.

Tratamento suave e eficaz da prisão de ventre, sem induzir ao hábito.

**Contra-indicações**

Hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

**Precauções**

O uso deste produto por diabéticos deve ser feito sob orientação médica face a presença de açúcar na sua composição.

Não existem outros cuidados específicos para a administração do produto.

**Atenção diabéticos: contém açúcar.**

**Eparema® Drágeas contém o corante amarelo de tartrazina que pode causar reações de natureza alérgica, entre as**

**quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.**

**Interações medicamentosas**

Até o momento, não foram relatados casos de interações medicamentosas com o uso do produto.

**Reações adversas**

Ainda não foram relatadas reações adversas com o uso do produto, não sendo conhecidas, portanto, a intensidade e a frequência destas.

**Posologia**

**Eparema® solução oral**

Adultos: 1 colher das de chá, pura ou diluída em pequeno volume de água, 2 vezes ao dia.

Em casos de prisão de ventre, poderão ser tomadas mais 1 ou 2 colheres das de chá ao deitar.

**Eparema® drágeas**


Adultos: 1 drágea, 2 vezes ao dia. Em casos de prisão de ventre, poderão ser tomadas mais 1 ou 2 drágeas, ao deitar.

Crianças acima de 10 anos: 1 drágea, 1 ou 2 vezes ao dia.


**Eparema® flaconetes**

Adultos: 1 flaconete, 2 vezes ao dia. Em casos de prisão de ventre, poderão ser tomados mais 1 ou 2 flaconetes, ao deitar.

Modo de usar o flaconete:



Romper o flaconete na área picotada.



Com o flaconete na boca, apertar levemente o fundo da embalagem.

**Superdose**

Não existem relatos de superdose com o uso do produto.

Na eventualidade da ingestão acidental de doses muito acima das habitualmente utilizadas, com manifestações clínicas de intoxicação, recomenda-se adotar medidas de controle das funções vitais.

**Pacientes idosos**

Não existem recomendações especiais sobre o uso do produto por pacientes idosos.

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

MS - 1.0639.0030

Farmacêutico Responsável: Wagner Moi

CRF-SP nº 14.828

Nº do lote, data da fabricação e data da validade: vide cartucho.

EM CASO DE DÚVIDAS LIGUE GRATUITAMENTE

**SAC: 0800-7710345**

www.nycomed.com.br

EP00\_NSPC\_0408

Cód. Laetus: 143

Cód.: 1030951

150x210 mm