

## EPITEGEL™

dexpantenol 50,0 mg/g

**INDICAÇÕES:** É indicado para o tratamento de suporte e posterior de todos os tipos de queratite como a queratite dendrítica, cauterizações, queimaduras, doenças distróficas da córnea, prevenção e tratamento de lesões corneais causadas pelo uso de lentes de contato. **CUIDADOS E ADVERTÊNCIAS:** Manter em local seco em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Depois de aberto, deverá ser consumido em 04 semanas. Produto exclusivo para uso oftálmico. Devido à natureza, em gel, a visão pode se apresentar embaçada por alguns minutos, imediatamente após a administração, e pode prejudicar a habilidade do paciente em dirigir veículos ou operar máquinas. Não deve ser usado durante a gravidez e lactação, exceto sob orientação médica. **REAÇÕES ADVERSAS:** Podem ocorrer reações de hipersensibilidade em casos isolados. Não existem registros de alterações de exames laboratoriais. **POSOLOGIA:** Dependendo da gravidade e intensidade das lesões, instilar uma gota no saco conjuntival de três a cinco vezes ao dia ou com maior frequência, de acordo com a prescrição médica. Durante a aplicação, não devem ser usadas lentes de contato. **CONTRA-INDICAÇÕES:** Hipersensibilidade a um dos componentes da fórmula. **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** Não são conhecidas interações medicamentosas. Quando usado com outros agentes oftálmicos tópicos, preferencialmente deve ser a última medicação administrada, após um intervalo de cerca de cinco minutos. Reg. MS - 1.1961.0012

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

Data de impressão das peças publicitárias.

