

epitezan®

acetato de retinol 10.000 UI
aminoácidos 2,5%
metionina 0,5%
cloranfenicol 0,5%

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Tubo contendo 3,5 g de pomada oftálmica estéril.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

POMADA OFTÁLMICA

Cada g contém: 10.000 UI de acetato de retinol, 25 mg de aminoácidos, 5 mg de metionina e 5 mg de cloranfenicol.

Veículo: metilparabeno, propilparabeno, álcool cetílico, lanolina, vaselina sólida e cera microcristalina.

INFORMAÇÃO AO PACIENTE

- Ação esperada do medicamento: ação de cicatrização, epitelização e antibiótica.
- Cuidados de armazenamento: o produto deve ser armazenado a temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) e ao abrigo da luz.
- Prazo de validade: vide cartucho. Não use medicamento com prazo de validade vencido.
- Gravidez e lactação: informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se estiver amamentando.
- Cuidados de administração: aplique a dose recomendada, no saco conjuntival, evitando tocar a ponta do tubo nos tecidos oculares. Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.
- Interrupção do tratamento: não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
- Reações adversas: informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

- Contra-indicações e precauções: informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

NÃO USE REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE

Informação Técnica

Epitezan® é uma pomada para uso tópico oftálmico, indicada para acelerar a cicatrização e a epitelização dos tecidos oculares lesados.

O acetato de retinol, ou vitamina A, é essencial para a manutenção do tecido epitelial.

Os aminoácidos (hidrolisados protéicos e metionina) colaboram no processo de cicatrização das lesões.

O cloranfenicol é um antibiótico de amplo espectro, eficaz na profilaxia de infecções bacterianas ou no combate de uma infecção já instalada.

Indicações

Para promover e proteger a epitelização e regeneração dos tecidos oculares lesados.

Contra-Indicações

Lesões contaminadas por microorganismos resistentes ao cloranfenicol. Hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Precauções e Advertências

O uso prolongado de antibióticos pode ocasionalmente favorecer a infecção por organismos não sensíveis, inclusive fungos. Raros casos de hipoplasia medular, inclusive anemia aplástica, foram relatados após o uso tópico do cloranfenicol.

Interações Medicamentosas

Não são conhecidas interações com outros medicamentos.

Reações Adversas

Infecções secundárias por microorganismos não sensíveis. Discrasias sangüíneas.

Posologia

Aplique cerca de 1 cm da pomada no saco conjuntival inferior, 3 a 4 vezes ao dia, de acordo com a indicação, ou a critério médico.

Superdosagem

Em geral, superdosagens não provocam problemas agudos. Se, acidentalmente, for ingerido, tome bastante líquido para diluir, ou procure orientação médica.

Pacientes Idosos

Não existem restrições de uso em pacientes idosos. A posologia é a mesma que a recomendada para as outras faixas etárias.

Nº de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

MS - 1.0147.0062

Resp. Téc.: Dra Maria Paula Marques

CRF-SP nº 11.682



Qualidade e Tradição a Serviço da Oftalmologia

ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

Av. Guarulhos, 3.272 - CEP 07030-000 - Guarulhos -SP

CNPJ 43.426.626/0009-24

Indústria Brasileira

® Marca Registrada

Texto adaptado à portaria 110/97

71880BR10T

Laetus: 53

Serviço de Atendimento ao Consumidor

0800-144077

Discagem Direta Grátis

LABALMURA