

Esta bula é continuamente atualizada. Favor proceder a sua leitura antes de utilizar o medicamento.

FALMONOX[®]
teclozana

SANOFI-AVENTIS

Forma farmacêutica e de apresentação

Comprimidos de 500mg em cartuchos contendo 3 comprimidos

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Uso oral

Composição

Cada comprimido contém:

teclozana 500mg

excipientes q.s.p. 1 comprimido

(amido de milho, croscarmelose sódica, povidona K30, talco e estearato de magnésio)

INFORMAÇÃO AO PACIENTE

Ação esperada do medicamento

FALMONOX[®] é um medicamento que possui em sua fórmula uma substância chamada teclozana. Esta substância possui ação amebicida, isto é, age no intestino eliminando um germe comumente chamado de ameba.

Cuidados de conservação

FALMONOX[®] deve ser guardado em sua embalagem original e protegido da luz e umidade.

Prazo de validade

Impresso na embalagem.

Ao comprar qualquer medicamento verifique o prazo de validade. Não use remédio com prazo de validade vencido. Além de não obter o efeito desejado, você poderá prejudicar sua saúde.

Gravidez e lactação

Apenas o médico pode decidir sobre o uso de FALMONOX[®] durante a gravidez e lactação, pois o uso de medicamento nesses períodos necessita de cuidados especiais. Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando.

Cuidados de administração

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Interrupção do tratamento

Não interrompa o tratamento nem troque de medicação sem o conhecimento de seu médico, pois isto poderá prejudicar o tratamento de sua doença.

Reações adversas

Informe seu médico sobre o aparecimento de reações desagradáveis com o uso de FALMONOX[®], em especial sintomas como erupção na pele, náuseas, gases ou vômitos.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Ingestão concomitante com outras substâncias

FALMONOX[®] não deve ser ingerido juntamente com bebidas alcoólicas. Informe seu médico caso esteja fazendo uso de outros medicamentos.

Contra-indicações

FALMONOX[®] está contra-indicado em pacientes sensíveis aos componentes da fórmula.

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

Precauções

Para evitar uma nova infecção, torna-se necessário observar medidas higiênicas, tais como: lavar as mãos sempre que necessário e lavar os vegetais antes de ingeri-los. Informe ao médico em caso de gravidez e amamentação.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DE SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Características

A teclozana é um derivado de dicloroacetamida, designado quimicamente por N, N' [1,4-fenilendimetileno]-bis [2,2-dicloro-N-(2-etoxietil) acetamida]. A teclozana é um amebicida sintético que não contém metais pesados. A experiência clínica confirma que teclozana associa uma rápida e eficaz ação antiamebiana e uma excelente tolerabilidade. A concentração amebicida *in vitro* da teclozana contra *E.histolytica* é de aproximadamente 1:10.000.000. A teclozana age ao nível da luz intestinal (ação local) indicado portanto para o tratamento da amebíase intestinal.

Por sua absorção limitada e baixa toxicidade, a teclozana tem sido utilizada com sucesso em diversos esquemas posológicos, com elevados índices de cura clínica e parasitológica.

Indicações

Tratamento de amebíase intestinal aguda ou crônica.

Contra-indicações

O uso de FALMONOX[®] está contra-indicado em pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Precauções e Advertências

O tratamento da amebíase extra-intestinal deve ser feito com um amebicida sistêmico, seguido de FALMONOX® com o objetivo de evitar recidiva. Os pacientes e seus familiares devem ser orientados com relação a medidas higiênicas, a fim de evitar reinfecção.

Gravidez e lactação

A segurança da teclozana nestas condições ainda não foi estabelecida. Assim, os benefícios do tratamento devem ser avaliados frente aos possíveis riscos para a mãe e para o concepto ou lactente.

Interações medicamentosas

Até o momento não foram descritas interações medicamentosas com a teclozana.

Reações adversas

São pouco freqüentes. Ocasionalmente pode ocorrer cefaléia, prurido, urticária e transtornos gastrintestinais, tais como náuseas, flatulência e vômitos.

Posologia e modo de usar

Adultos e crianças com mais de 8 anos: dose total de 1500mg, de acordo com um dos esquemas abaixo:

- 500mg a cada 12 horas (3 doses);
- 500mg por dia, divididos em várias tomadas, durante 3 dias.

Superdosagem

Até o momento não foram descritos casos de superdosagem com o uso de teclozana. Caso venha a ocorrer, recomendam-se medidas gerais de suporte, êmese provocada ou lavagem gástrica.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

MS. 1.1300.1034

Farm. Resp.: Antonia A. Oliveira
CRF-SP Nº 5854

Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda.

Rua Conde Domingos Papais, 413
Suzano – SP
CEP 08613-010
CNPJ 02.685.377/0008-23
Indústria Brasileira
® Marca Registrada

IB280706C

Lote, fabricação e validade: VIDE RÓTULO E/OU CARTUCHO

LOGOTIPO DO SAC