

de uma vez por todas a passagem do sangue pelas veias. A trombose às vezes ocorre nas veias profundas das pernas (trombose venosa profunda). Se este tipo de trombose não for tratado imediatamente, pode se desenvolver em uma trombose pulmonar, uma condição fatal. Pode se desenvolver também em uma trombose profunda de uma veia do braço. A trombose pulmonar é a mais comum das tromboembolias. A trombose venosa profunda das pernas (trombose venosa profunda) é rara. O risco de ocorrência de trombose venosa profunda é maior em pessoas com trombofilia, uma condição genética que aumenta o risco de trombose venosa profunda. A trombofilia pode ser hereditária ou adquirida. A trombofilia hereditária pode ocorrer durante a gravidez. O risco de ocorrência é maior entre as pessoas com trombofilia adquirida, sendo seguido pelas usuárias e, posteriormente, pelas não usuárias de contraceptivos orais. Os cogulhos sanguíneos também podem ocorrer em pessoas com doenças cardíacas, especialmente aquelas com insuficiência cardíaca congestiva, doença da válvula cardíaca, doença da artéria coronária e doença da artéria carótida. O risco de ocorrência de trombose venosa profunda é maior em pessoas com doenças cardíacas, especialmente aquelas com insuficiência cardíaca congestiva, doença da válvula cardíaca, doença da artéria coronária e doença da artéria carótida. O risco de ocorrência de trombose venosa profunda é maior em pessoas com doenças cardíacas, especialmente aquelas com insuficiência cardíaca congestiva, doença da válvula cardíaca, doença da artéria coronária e doença da artéria carótida.

diabete melito com lesão de vasos sanguíneos;
história atual ou anterior de pancreatite, associada com níveis altos de
triglicérides no sangue;

PAPEL
RECICLABLE

