

## *Mikania glomerata*, Sprengel 0,55 mg/mL+ Associações

### Nomenclatura Botânica oficial:

Extrato fluido de jucá (*Caesalpineia ferrea*, Martius)  
Família: Leguminosae  
Parte utilizada: casca e semente

Extrato fluido de agrião (*Roripa Nasturtium*, Linné)  
Família: Brassicales  
Parte utilizada: planta fresca

Xarope de guaco (*Mikania glomerata*, Sprengel)  
Família: Asteracea  
Parte utilizada: folha

Extrato fluido de cambará (*Lantana camara*, Linné)  
Família: Verbenaceae  
Parte utilizada: folhas

Extrato fluido de maracujá (*Passiflora alata*, Aiton)  
Família: Passifloraceae  
Parte utilizada: folhas

Extrato fluido de erva-silvina (*Polypodium vacciniifolium*, Langsdorff e Fischer)  
Família: Polypodiaceae  
Parte utilizada: planta inteira

Extrato fluido de Óleo-vermelho (*Myrospermum Erytroxilon*, Freire Alemão)  
Família: leguminosae  
Parte utilizada: casca

### APRESENTAÇÃO

Líquido. Frasco contendo 100, 150 e 250 mL

### USO ORAL - USO ADULTO E PEDIÁTRICO.

### COMPOSIÇÃO

Cada mL contém:

Extrato fluido de jucá ( <i>Caesalpineia ferrea</i> , Martius) .....	0,100 mL
Extrato fluido de agrião ( <i>Roripa Nasturtium</i> , Linné) .....	0,030 mL
Xarope de guaco ( <i>Mikania glomerata</i> , Sprengel).....	0,030 mL
Extrato fluido de cambará ( <i>Lantana camara</i> , Linné) .....	0,030 mL
Extrato fluido de maracujá ( <i>Passiflora alata</i> , Aiton).....	0,020 mL
Extrato fluido de erva-silvina ( <i>Polypodium vacciniifolium</i> , Langsdorff e Fischer).....	0,030 mL
Extrato fluido de Óleo-vermelho ( <i>Myrospermum Erytroxilon</i> , Freire Alemão) .....	0,020 mL
Veículo* .q.s.p.....	1,000 mL

(\*Veículo: Benzoato de sódio, Açúcar e Água purificada.)

Concentração dos Ativos.

### Os extratos estão padronizados conforme relacionados abaixo:

Extrato fluido de jucá (*Caesalpineia ferrea*, Martius) em 0,4 – 0,8% de taninos  
Extrato fluido de agrião (*Roripa Nasturtium*, Linné) em 0,13-0,26 de ácido ascórbio  
Xarope de guaco (*Mikania glomerata*, Sprengel) em 0,03 – 0,08% de cumarina  
Extrato fluido de maracujá (*Passiflora alata*, Aiton) em 0,2- 1,0% de hiperosídeo  
Extrato fluido de erva-silvina (*Polypodium vacciniifolium*, Langsdorff e Fischer) em 1,3 – 2,6 %  
Extrato fluido de Óleo-vermelho (*Myrospermum Erytroxilon*, Freire Alemão) 5,0 – 10% de ácido benzóico , 2,0 - 4,0% de eugenol.

### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

#### 1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento é auxiliar no tratamento das traqueobronquites, afecções pulmonares, tosse, asma.

#### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Atua como auxiliar no tratamento das afecções do aparelho respiratório e suas manifestações desagradáveis como a tosse e expectoração. Seu médico é a pessoa mais adequada para lhe dar maiores informações sobre o tratamento, siga sempre suas orientações.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Pacientes com histórico de hipersensibilidade e alergia a qualquer um dos componentes da fórmula não devem fazer uso do produto. Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico.

### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO?

O produto encerra em sua composição um grupo de substâncias há muito, são empregadas com sucesso no tratamento das afecções do aparelho respiratório, acompanhadas de tosse e expectoração, graças às suas propriedades anti-sépticas e fluidificantes da árvore respiratória. **Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

### 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar em temperatura ambiente (15-30°C), proteger da luz solar e umidade. Nestas condições, o medicamento se manterá próprio para o consumo, respeitando o prazo de validade indicado na embalagem. **Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem. Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.** O produto de aspecto líquido, de coloração castanho escuro e de odor característico. **Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

### 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Adultos: Ingerir de 2 a 5 colheres das de sopa (15 mL), ao dia.

Crianças: Ingerir de 1 a 2 colheres das de sopa (15 mL), ao dia.

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

### 7. O QUE DEVO FAZER QUANDO ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Em caso de dúvida, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

### 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Nas doses recomendadas não são conhecidos efeitos adversos ao medicamento. **Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis e problemas com este medicamento, entrando em contato através do Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC).**

### 9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Em caso de superdosagem, suspender o uso, procurar orientação médica de imediato para que sejam adotadas as medidas habituais de apoio e controle das funções vitais. **Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.**

### DIZERES LEGAIS

M.S. Nº 1.0576.0104.001-4 – 100mL

1.0576.0104.002-2 – 150mL

1.0576.0104.003-0 – 250mL

Farmacêutico Responsável: Lilion Manhães Pessanha

CRF - RJ 3229

### LABORATÓRIO SIMÕES LTDA.

Rua Pereira de Almeida,102 - Praça da Bandeira - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ 33.379.884/0001-96

Indústria Brasileira

SAC.: (21) 2502-7000

www.labsimoes.com.br

Esta bula foi atualizada em 19/10/2009.

