



**BULA:  
FOR GAS  
CÓD. 026819**

COR: 1x1

Pantone Process Black U

Dimensão: 240 x 150 mm

Escala: 100%

Plataforma: Macintosh

Software: Indesign CS3

Prova nº 05

Elaborado por: AST DESIGN

Data: 09/08/2010

Revisado por:

**Alterações**

- Alteração de faca de 150x150 mm para: 240x150 mm;
- Alteração do código de: 027735D para: 026819, com exclusão do versionamento;
- Inclusão do pictograma reciclado;
- Inclusão do código laetus nº 215;
- Adequação a nova regra gramatical;
- Revisão geral do texto feita pelo Registro

Não exceda a dose recomendada.

Atenção diabéticos: o comprimido contém açúcar.

**Gravidez:** este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

**Amamentação e Pediatria:** não há recomendações especiais para lactantes e crianças.

#### INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

Não são conhecidas interações de **FOR GAS** com outros medicamentos ou alimentos.

#### INTERFERÊNCIA EM EXAMES LABORATORIAIS:

Não são conhecidos relatos de interferência de **FOR GAS** nos resultados de exames laboratoriais.

#### REAÇÕES ADVERSAS/COLATERAIS:

**O FOR GAS é fisiologicamente inerte. Após administração oral, a simeticona é eliminada pelas fezes de forma inalterada. Entretanto poderá ocorrer:**

- Risco de eczema de contato;
- Em casos raros: reações imediatas como urticária e broncoespasmo.

#### POSOLOGIA:

##### Comprimidos:

Tomar 1 comprimido 3 vezes ao dia, às refeições.

##### Emulsão Oral (30 gotas/mL):

Crianças (lactentes): 4 a 6 gotas, 3 vezes ao dia.

Até 12 anos: 6 a 12 gotas, 3 vezes ao dia.

Acima de 12 anos e Adultos: 16 gotas, 3 vezes ao dia.

As gotas podem ser administradas diretamente na boca, ou diluídas em um pouco de água ou outro alimento.

O frasco deve ser agitado antes de ser usado.

A dose máxima diária de simeticona deve ser limitada a 500 mg (12 comprimidos ou 200 gotas).

#### SUPERDOSAGEM:

Experiência de superdose após a comercialização é limitada, sendo registrada com ou sem sintomas. Sintomas podem incluir diarreia e dor abdominal. Entretanto, caso ocorra ingestão acidental excessiva, consulte um médico imediatamente.

#### PACIENTES IDOSOS:

Não há restrições específicas para o uso em pacientes idosos.

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR.  
NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS,  
PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

Número do lote, data da fabricação e data da validade:  
vide cartucho

Registro MS – 1.0497.0208



##### Comprimido:

**UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A**

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90 - Embu-Guaçu - SP

CEP 06900-000 SAC 0800 11 1559

CNPJ 60.665.981/0001-18 - Indústria Brasileira

Farm. Resp.: Ishii Massayuki - CRF-SP nº 4863

##### Emulsão oral:

Produzido na unidade fabril:

Rua José Pedro de Souza, 105 - Pouso Alegre - MG

CEP 37550-000 CNPJ 60.665.981/0005-41

Indústria Brasileira

Farm. Resp.: Tiago César da Silva Andrade CRF-MG nº 17931

## FOR GAS simeticona

Comprimido / Emulsão Oral



ATENÇÃO: O NOME DA SUBSTÂNCIA ATIVA DE FOR GAS FOI MODIFICADO DE DIMETICONA PARA SIMETICONA, A QUALIDADE, SEGURANÇA E EFICÁCIA DO PRODUTO PERMANECEM INALTERADAS.

#### IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

##### FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES:

**Comprimido:** caixa com 20 comprimidos.

**Emulsão oral** (gotas): frasco gotejador contendo 10 mL.

##### USO ADULTO E PEDIÁTRICO

##### USO ORAL

##### COMPOSIÇÃO:

###### Comprimido

Cada comprimido contém:

simeticona ..... 40 mg

Excipientes: celulose microcristalina, povidona, sacarose, dióxido de silício coloidal, croscarmelose sódica, amido, carbonato de cálcio, lactose, estearato de magnésio, manitol, etilcelulose, macrogol, hipromelose.

###### Emulsão oral (gotas)

Cada mL (30 gotas) da emulsão oral contém:

simeticona ..... 75 mg

Veículo: carmelose sódica, metilparabeno, propilparabeno, celulose microcristalina, ciclamato de sódio, corante vermelho FD&C 40, aroma de cereja, ácido cítrico, óleo de rícino, propilenoglicol, água purificada.

EE 0266819 - 240 x 150 mm - Laetus 215



## **INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

### **AÇÃO ESPERADA DO MEDICAMENTO:**

**FOR GAS** atua no estômago e no intestino, diminuindo a tensão superficial dos líquidos digestivos, rompendo as bolhas que retêm os gases e que provocam flatulências e dores. Assim, os gases são eliminados mais facilmente, diminuindo o desconforto causado por eles.

### **CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:**

Manter o produto em sua embalagem original e conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Os comprimidos também devem ser mantidos ao abrigo da umidade.

### **PRAZO DE VALIDADE:**

24 meses a partir da data de fabricação (vide cartucho). Não use medicamentos com o prazo de validade vencido.

### **GRAVIDEZ E LACTAÇÃO:**

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se está amamentando.

### **CUIDADOS DE ADMINISTRAÇÃO:**

As gotas podem ser administradas diretamente na boca, ou diluídas em um pouco de água ou outro alimento. O frasco deve ser agitado antes de ser usado.

Os comprimidos devem ser engolidos com um pouco de água.

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

### **REAÇÕES ADVERSAS:**

Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis. A simeticona não é absorvida pelo organismo,

atuando somente dentro do aparelho digestivo, e é totalmente eliminada nas fezes, sem alterações. Dessa maneira, não costuma provocar reações indesejáveis no organismo.

- Risco de eczema de contato;
- Em casos raros: reações imediatas como urticária e broncoespasmo.

### **TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

### **INGESTÃO CONCOMITANTE COM OUTRAS SUBSTÂNCIAS:**

Não são conhecidas restrições específicas quanto à ingestão concomitante com alimentos e bebidas.

### **CONTRAINDICAÇÕES E PRECAUÇÕES:**

O produto não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Não exceda a dose recomendada.

### **Não use FOR GAS se você apresentar algum dos seguintes sintomas:**

- **Distensão abdominal grave;**
- **Cólica grave;**
- **Sensibilidade exacerbada à dor (mais que 36 horas);**
- **Massa abdominal palpável;**

Atenção diabéticos: o comprimido contém açúcar.

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

### **NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.**

## **INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

### **CARACTERÍSTICAS:**

**FOR GAS**, que é a simeticona, é um silicone antiespumante, que apresenta ação antiflatulenta, aliviando o mal estar

gástrico causado pelo excesso de gases.

O acúmulo de gases no estômago e intestino chama-se flatulência e causa incômodo, estufamento, dor ou cólicas no abdômen. A eliminação dos gases alivia esses sintomas.

**FOR GAS** atua no estômago e no intestino, diminuindo a tensão superficial dos líquidos digestivos, levando ao rompimento das bolhas que retêm os gases. Uma vez livres os gases são facilmente eliminados por eructações ou flatos.

### **INDICAÇÕES:**

**FOR GAS** está indicado no caso de excesso de gases no aparelho gastrointestinal constituindo incômodo, motivo de dores ou cólicas intestinais, tais como:

- Meteorismo
  - Eructação
  - Borboríngos
  - Aerofagia
  - Pós operatório e convalescença
  - Distúrbios fermentativos intestinais
- É indicado ainda no preparo intestinal dos pacientes para radiografia do abdome para reduzir o número de bolhas no trato gastrointestinal e sombras. Similarmente, a preparação para endoscopia digestiva envolve a administração de simeticona, que, por sua ação anti-espumante, melhora a visibilidade, como resultado da redução da presença de bolhas no cólon que podem dificultar a detecção de lesões na mucosa do trato gastrointestinal.

### **CONTRAINDICAÇÕES:**

**FOR GAS é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.**

**FOR GAS é contraindicado aos pacientes com perfuração ou obstrução intestinal suspeita ou conhecida.**

### **PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:**

**Gerais:** não há advertências ou recomendações especiais sobre o uso de simeticona.