

-Cânfora - Possui ação irritante cutânea, revulsiva, útil nos processos dolorosos de estruturas profundas, tipo fibrosite, mialgia, lumbago. Produz ainda leve anestesia local.
-Mentol - Alcool terpênico obtido da essência de várias espécies do gênero Mentha e também por síntese. Aplicado localmente causa uma sensação de frio por estímulo específico dos receptores e, em seguida, anestesia discreta.

INDICAÇÕES

-No tratamento local de manifestações reumáticas, lumbago, artrite, bursite, nas dores musculares e nevralgias, torcicolos e contusões.

CONTRA-INDICAÇÕES

-Não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

-Pacientes com história anterior de convulsões.

-O medicamento não pode ser aplicado nas mucosas, dermatoses, varizes e ferimentos.

"ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO EM CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE".

PRECAUÇÕES

-O produto não deve ser aplicado em pele com lesões. Deve ser usado com cautela em crianças, pois o salicilato de metila é considerado como veneno pediátrico em pequenas doses orais estabelecidas.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

-Não existem relatos até o momento.

POSOLOGIA

-Aplicar pequena quantidade, 2 a 3 vezes ao dia, na região afetada com fricção demorada.

SUPERDOSAGEM

-Apesar do nível de absorção sistêmica ser baixo, medidas de suporte devem ser tomadas a critério médico.

MODO DE USAR

-Friccione a parte dolorida durante alguns minutos, com pequena quantidade do produto envolvendo-a depois com um pano de flanela ou lâ 2 a 3 vezes ao dia.

PACIENTES IDOSOS

-Deve seguir a mesma dose usual dos adultos.

Número do lote, data de fabricação e prazo de validade:

VIDE CARTUCHO

MS: 1.0392.0057

Farm. Resp. Dra. Giovana Bettoni - CRF-GO n° 4617

SAC
0800 622929

Vitapan

Indústria Farmacêutica Ltda.
Rua VPR 01 - Quadra 2A
Módulo 01 - DAIA - Anápolis - GO
CNPJ: 30.222.814/0001-31
Indústria Brasileira
www.vitapan.com.br

100789 - 09/08A



Gellat

salicilato de metila
cânfora
mentol

**USO ADULTO E PEDIÁTRICO (CRIANÇAS ACIMA DE 2 ANOS DE IDADE)
USO EXTERNO**

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Pomada 20g; Embalagem contendo 01 bisnaga.

COMPOSIÇÃO

Cada grama de pomada contém:

salicilato de metila.....0,0444mL
cânfora.....0,0444g
mentol.....0,0200g

Excipiente q.s.p.....1g
(essência de alfazema, essência de terebentina, vaselina líquida, vaselina sólida, essência de mostarda, essência de alecrim e parafina branca).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

-Através da ação de cada componente da fórmula, GELLAT age como revulsivante, rubefaciente e leve anestésico local, ativando a circulação sanguínea no local afetado, promovendo, assim, pronto alívio dos fenômenos dolorosos de estruturas profundas.

-Modo de usar: Massagear a parte afetada com uma pequena quantidade do produto, por alguns minutos, envolvendo-a em seguida com uma flanela 2 a 3 vezes ao dia.

-Cuidados de conservação: Conservar o produto em temperatura ambiente (15-30°C). Proteger da luz e da umidade.

-Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação (**VIDE CARTUCHO**). Não use medicamento com o prazo de validade vencido.

-"Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após seu término, e se está amamentando".

-"Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento".

-"Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico".

-"**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**"

-A ocorrência de qualquer reação adversa deverá ser comunicada ao seu médico. Raramente pode ocorrer dermatite de contato, erupções cutâneas e urticárias.

-"**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**"

-Não deve ser utilizada em pacientes com hipersensibilidade aos componentes do produto.

-**Contra-indicações:** não aplique GELLAT sobre ferimentos, dermatoses, varizes e nas mucosas nasal, oral e ocular, sua ingestão oral pode causar envenenamento, principalmente em crianças.

-"**ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO EM CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE.**"

-**Precauções:** (VIDE item Precauções)

-"Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento".

-"**NÃO USE REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.**"

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

-**Modo de Ação:** salicilato de metila - Revulsivo orgânico volátil, age produzindo ação local irritante, com efeitos indiretos de atividade à distância sobre estruturas somáticas (músculos), serosas, articulações, vísceras e de estimulação reflexa dos centros bulbares. Provoca analgesia e hiperemia nas regiões cutâneas em que é aplicado, invadidas pelo mesmo segmento do sistema nervoso central.