

**Genteal<sup>®</sup>**  
hipromelose

3 mg/ mL

**Forma farmacêutica e apresentação**

Solução oftálmica: frasco conta-gotas contendo 10 mL de solução.

**USO ADULTO**

**Composição**

Cada ml contém: 3,0 mg de hipromelose; excipientes: perborato de sódio (conservante), cloreto de sódio, cloreto de potássio, ácido bórico, Dequest 2060S, ácido clorídrico e água para injeção.

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

**Ação esperada do medicamento:** GENTEAL, que tem como substância ativa a hipromelose, tem ação lubrificante ocular.

**Cuidados de armazenamento:** o produto deve ser armazenado à temperatura entre 15° e 25°C.

**Prazo de validade:** o prazo de validade está impresso no cartucho. Não utilize o produto após a data de validade. Não utilizar o produto por mais de 30 dias após a abertura do frasco.

**Gravidez e lactação:** GENTEAL somente deve ser utilizado durante a gravidez e lactação sob critério e supervisão médica. Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando.

**Cuidados de administração:** Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

**Interrupção do tratamento:** Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

**Reações adversas:** Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis, tais como: dor nos olhos, alteração na visão, vermelhidão e irritação.

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

**Uso concomitante de outras substâncias:** em caso de algum tratamento ocular adicional local, deve haver um intervalo de aplicação de no mínimo 5 minutos entre as medicações. GENTEAL deve ser sempre a última medicação a ser instilada.

**Contra-indicação e precauções:** Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento. GENTEAL é contra-indicado nos casos de alergia conhecida a algum componente da fórmula. Caso ocorra dor nos olhos, alteração na visão, vermelhidão ou irritação e se estes sintomas persistirem ou piorarem por mais de 72 horas, descontinue o uso e procure o seu oftalmologista.

PRODUTO DE USO EXCLUSIVO EM ADUTOS. O USO EM CRIANÇAS REPRESENTA RISCO À SAÚDE.

**NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DE SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.**

### **INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

GENTEAL é um produto que difere das lágrimas multidoses por ser preservado em frascos pelo único conservante que se dissocia: o perborato de sódio. Através do contato com o olho, o perborato de sódio se transforma em água pura e oxigênio, portanto, minimiza as irritações que podem ser causadas pelos conservantes. A hipromelose, presente nesta formulação, proporciona um nível adequado de viscosidade ao produto, de modo a conferir propriedades emolientes e lubrificantes ideais para o alívio do olho seco, assegurando ainda um prolongamento de tais efeitos devido ao maior tempo de permanência deste junto à superfície do olho.

### **Indicações**

Colírio lubrificante ocular e para alívio dos sintomas de olho seco e irritações oculares, devido a exposições ao vento, sol e outros agravantes, sendo também apropriado para os usuários de lentes de contato.

### **Contra-indicações**

*Não utilize o produto se for alérgico a algum componente da fórmula.*

### **Precauções e Advertências**

*Caso ocorra dor nos olhos, alteração na visão, vermelhidão ou irritação e se essas condições persistirem ou piorarem por mais de 72 horas, descontinuar o uso e procurar o seu oftalmologista. Para manter a esterilidade do produto deve-se evitar o contato da extremidade gotejadora do frasco com qualquer superfície.*

**Gravidez e lactação:** *não há evidências referentes à segurança do uso de GENTEAL durante a gravidez e lactação em humanos, portanto, o produto somente deve ser utilizado nesses casos sob critério e supervisão médica.*

### **Interações medicamentosas**

Em caso de algum tratamento ocular adicional local, deve haver um intervalo de aplicação de no mínimo 5 minutos entre as medicações. GENTEAL deve ser sempre a última medicação a ser instilada.

### **Reações adversas**

*Ocasionalmente tem sido relatadas, dor nos olhos, alteração na visão, vermelhidão e irritação.*

### **Posologia**

Instilar 1 ou 2 gotas no olho afetado quando necessário ou a critério médico.

### **Superdosagem**

Não há informações de superdosagem com este produto.

### **Pacientes idosos**

Não existem advertências ou recomendações especiais sobre o uso do produto por pacientes idosos.

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**

Reg. MS 1.0068.0872

Farm. Resp.: Marco A. J. Siqueira - CRF-SP n° 23873

® = marca registrada de Novartis AG - Basileia - Suíça

Fabricado por: EXCELVISION - Annonay - França

Importado e Distribuído por:

Novartis Biociências S.A. - Av. Ibirama, 518 - Complexos 441/3 - Taboão da Serra - SP  
- CNPJ: 56.994.502/0098-62 - Indústria Brasileira

Única concessionária no Brasil de Novartis AG, Basileia, Suíça; resultante da fusão da Ciba-Geigy e Sandoz.



Lote, data de fabricação e de validade: vide cartucho