

Glautimol®

0,5 %

timolol

maleato

Solução Oftálmica Estétil

INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

O que é GLAUTIMOL® Solução Oftálmica (maleato de timolol)?

Forma Farmacêutica e Apresentação:

Frasco plástico conta-gotas contendo 5 ml de solução oftálmica estétil a 0,5%.

Uso Oftálmico

Uso Adulto e Pediátrico

Ingrediente ativo: cada ml de GLAUTIMOL Solução Oftálmica 0,5% contém: 5,0 mg de timolol (6,8mg de maleato de timolol)

Ingredientes inativos: fosfato de sódio dibásico anidro, fosfato de sódio monobásico monoidratado, ácido clorídrico e/ou hidróxido de sódio, cloreto de benzalcônio 0,01% como conservante e água purificada q.s.p. 1 ml.

Como este medicamento funciona?

GLAUTIMOL® é um betabloqueador que reduz a pressão intra-ocular. GLAUTIMOL Solução Oftálmica é um medicamento oftálmico beta-bloqueador que diminui a pressão do olho.

Por que este medicamento foi indicado?

GLAUTIMOL Solução Oftálmica foi prescrito para reduzir o aumento da pressão intra-ocular no tratamento de glaucoma e/ou hipertensão ocular.

A pressão ocular elevada pode comprometer o nervo óptico, resultando em deterioração da visão e possível cegueira. Em geral, existem alguns sintomas que podem ocorrer, e indicam se você apresenta pressão ocular interna elevada. Informe ao seu médico se você apresenta pressão ocular interna elevada. O exame médico é necessário para a determinação desta doença. Se ocorrer aumento da pressão intra-ocular, serão necessários exames e medidas regulares da pressão intra-ocular.

Quando não devo usar este medicamento?

Contra-indicações: Você não deve usar GLAUTIMOL Solução Oftálmica se:

- Tiver asma ou já tiver tido asma
- Apresentar doença pulmonar obstrutiva crônica
- Apresentar alguns tipos de doenças cardíacas
- For alérgico a qualquer um de seus ingredientes

Se não tiver certeza se deve utilizar GLAUTIMOL Solução Oftálmica, entre em contato com o seu médico.

Advertências

Uso na gravidez e amamentação: Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Não use GLAUTIMOL Solução Oftálmica se estiver amamentando. Consulte seu médico, caso pretenda amamentar.

Uso Pediátrico:

GLAUTIMOL Solução Oftálmica pode ser utilizado em crianças, desde que prescrito por seu médico, porém não está indicado para uso por prematuros ou recém-nascidos.

A dose usual para crianças é de uma gota de GLAUTIMOL® 0,5% (de acordo com a prescrição médica) a cada 12 horas no(s) olho(s) afetado(s).

O que devo dizer para o meu médico antes de usar GLAUTIMOL Solução Oftálmica?

Precauções

Informe ao seu médico sobre quaisquer problemas médicos que esteja apresentando ou tenha apresentado, principalmente asma ou outros problemas pulmonares ou cardíacos e sobre quaisquer alergias a quaisquer tipos de medicamentos.

Se suspeitar que GLAUTIMOL Solução Oftálmica está causando reação alérgica (por exemplo, erupção cutânea ou vermelhidão e coceira nos olhos) interrompa o tratamento e entre em contato com seu médico imediatamente.

Informe ao seu médico se desenvolver infecção ocular, ocorrer lesão ocular, se submeter à cirurgia ocular ou desenvolver reação, incluindo sintomas novos ou piora dos sintomas.

O que devo saber sobre os ingredientes inativos do GLAUTIMOL®?

GLAUTIMOL Solução Oftálmica contém cloreto de benzalcônio como conservante. Este conservante pode ser absorvido por lentes de contato gelatinosas. Se você for usuário (a) de lentes de contato gelatinosas, consulte seu médico antes do uso do GLAUTIMOL Solução Oftálmica.

Posso dirigir ou operar máquinas enquanto estiver usando GLAUTIMOL®?

Existem efeitos adversos associados ao uso deste produto que podem afetar sua capacidade de conduzir veículos ou operar máquinas (veja **Quais efeitos adversos o GLAUTIMOL Solução Oftálmica pode causar?**).

Posso utilizar GLAUTIMOL® com outros medicamentos?

Interações medicamentosas

É particularmente importante se estiver tomando medicamentos anti-hipertensivos ou para tratamento de doenças cardíacas.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

Não há contra-indicação relativa a faixas etárias; exceto prematuros e recém-nascidos (Veja Uso pediátrico).

Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.

Como devo usar este medicamento?

Aspecto físico

GLAUTIMOL Solução Oftálmica é uma solução clara, incolor a levemente amarelada.

Características organolépticas

Veja aspecto físico

Dosagem

Seu médico irá estabelecer a dose e a duração adequadas do tratamento.

A dose usual inicial é de uma gota de GLAUTIMOL Solução Oftálmica no(s) olho(s) afetado(s) pela manhã e à noite.

Não altere a dose do medicamento sem consultar seu médico. Se tiver de interromper o tratamento, entre em contato com seu médico imediatamente.

Como usar?

Não deixe que a ponta do frasco toque seus olhos ou áreas ao redor dos olhos. GLAUTIMOL Solução Oftálmica pode ficar contaminado com bactérias que podem causar infecções oculares e lesões sérias ao olho, incluindo perda da visão. Para evitar possível contaminação do frasco, mantenha a ponta do frasco longe do contato com qualquer superfície.

- 1- Antes de utilizar a medicação, certifique-se de que o lacre de segurança está intacto. Um espaço entre o frasco e a tampa é normal para o frasco não aberto.
- 2- Retire o lacre de segurança.
- 3- Para abrir o frasco, desenrosque a tampa girando-a.
- 4- Incline sua cabeça para trás e puxe levemente sua pálpebra inferior para formar uma bolsa entre a sua pálpebra e o seu olho.
- 5- Inverta o frasco e pressione levemente com o dedão ou com o dedo indicador até que uma única gota seja dispensada no olho, conforme a prescrição médica. **NÃO TOQUE A PONTA DO FRASCO NOS OLHOS OU NAS PÁLPEBRAS.**
- 6- Repita os passos 4 e 5 no outro olho, se o seu médico assim o instruiu.
- 7- Recoloque a tampa, rosqueando até que esta esteja tocando firmemente o frasco.
- 8- A ponta gotejadora foi desenhada para fornecer uma gota pré-medida, portanto **NÃO** aumente o furo da ponta gotejadora.
- 9- Após ter utilizado todas as doses, irá sobrar um pouco de GLAUTIMOL Solução Oftálmica no frasco. Não se preocupe, pois foi acrescentada uma quantidade extra de GLAUTIMOL® no frasco e você utilizará a quantidade integral de GLAUTIMOL® prescrita por seu médico. Não tente remover o excesso de medicamento do frasco.

O que fazer se esquecer de usar uma dose?

Se esquecer uma dose, aplique o medicamento o mais rápido possível. No entanto, se estiver próximo do horário da próxima dose, ignore a dose esquecida e volte ao esquema posológico regular.

Em alguns casos, seu médico poderá prescrever outro medicamento, incluindo outros colírios, para uso com GLAUTIMOL Solução Oftálmica, para ajudar a diminuir a pressão de seu (s) olho (s).

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

Quais os efeitos adversos que GLAUTIMOL Solução Oftálmica pode causar?

Reações Adversas:

Qualquer medicamento pode apresentar efeitos não esperados ou indesejáveis, chamados de reações adversas. Apesar de não ocorrerem todas essas reações adversas, se ocorrerem, você pode precisar de atenção médica.

Você pode apresentar irritação ocular, incluindo queimação e pontadas, ressecamento e vermelhidão dos olhos ou alterações da visão, tais como visão dupla. Além disso, os seguintes efeitos adversos podem ocorrer: zumbido, dor de cabeça, cansaço, tontura, depressão, insônia, pesadelos, perda da memória, formigamento, náusea, diarreia, distúrbios estomacais, ressecamento da boca, dor torácica, desmaio, palpitações, batimento cardíaco irregular, redução da frequência cardíaca, inchaço e esfriamento das mãos e dos pés, falta de ar, tosse, queda de cabelo, erupções na pele, coceira ou outros tipos de reações alérgicas mais graves e diminuição do desejo sexual.

Outras reações adversas podem ocorrer raramente e algumas delas podem ser graves. Pergunte ao seu médico mais informações sobre as reações. Ele tem uma lista mais completa dessas reações.

Informe ao seu médico prontamente sobre qualquer um desses ou outros sintomas.

Se você suspeitar de que GLAUTIMOL Solução Oftálmica está causando uma reação alérgica (por exemplo, erupções na pele ou vermelhidão e coceira no olho), pare de usá-lo e procure seu médico imediatamente. Consulte seu médico para saber se você deve ou não continuar a utilizar GLAUTIMOL Solução Oftálmica, se tiver uma infecção ou sofrer um traumatismo ocular, se precisar submeter-se a uma cirurgia ocular ou se desenvolver reação ocular com aparecimento de sintomas novos ou piora de sintomas durante o tratamento.

O que fazer se alguém usar uma grande quantidade deste medicamento de uma só vez?

Se você aplicar muitas gotas em seu olho ou engolir parte do conteúdo do frasco, entre outros efeitos, você pode ter alucinações, dificuldade para respirar ou sentir que sua frequência cardíaca diminuiu. Entre em contato com seu médico imediatamente.

Onde e como devo armazenar este medicamento?

Armazene o frasco de GLAUTIMOL Solução Oftálmica fechado em temperatura ambiente (15 a 30°C).

Não use este medicamento após a expiração da data de validade impressa na embalagem.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Lote, fabricação e validade: vide cartucho.

MS-1.0023.0173.004-7

Farm. Resp.: Lygia C. Piazza CRF-SP No. 8066

ALCON LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.

Av. N. S. da Assunção, 736 05359-001 São Paulo SP

CNPJ 60.412.327/0013-36

Indústria Brasileira

Serviço de atendimento ao consumidor: 0800 707 7908

sacbrasil@alconlabs.com

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Lote, fabricação e validade: Vide cartucho.

www.alconlabs.com.br

© 2008 Alcon, Inc.

Alcon®

ALCON LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.