

Leveglutan

levedo de cerveja



FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO:

Frascos com 100 comprimidos.

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido contém:

Levedo de cerveja (correspondendo a 200 mg de proteínas 0,06 mg de vitamina B1 e 0,02 mg de vitamina B2)	0,500 g
Vitamina B1	0,10 mg
Vitamina B2	0,05 mg
Excipiente (Glicerina, talco, estearato de magnésio) q.s.p.	1 comprimido

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Ação esperada do medicamento: suplementação de vitaminas do Complexo B em casos de hipovitaminoses decorrentes de alimentação inadequada ou stress fisiológico.

Cuidados de conservação: conserve o produto em sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15 e 30° C) e ao abrigo da luz e umidade.

Prazo de validade: observados os cuidados de conservação, o produto tem validade de 24 meses. Não use medicamento com o prazo de validade vencido, pode ser perigoso para sua saúde.

Gravidez e lactação: informe ao médico se está amamentando ou a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após seu término.

Cuidados de administração: os horários de administração e a dose devem ser rigorosamente seguidos assim como todas as instruções fornecidas pelo seu médico. Informe ao seu médico se estiver fazendo uso de outros medicamentos.

“TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.”

“NÃO TOME MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.”

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

A levedura de cerveja é uma das substâncias mais ricas em nutrientes naturais, especialmente vitaminas e proteínas. Constitui considerável fonte natural de vitaminas do Complexo B. As vitaminas do Complexo B presentes participam de sistemas enzimáticos e como tais, regulam várias fases do metabolismo dos glicídios, dos lipídios e das proteínas. A tiamina desempenha um papel importante na conversão do açúcar no sangue (glicose) em energia biológica.

INDICAÇÕES

Nos estados de hipovitaminoses do Complexo B e suas manifestações. Nas convalescenças e nos estados de desnutrição.

CONTRA-INDICAÇÕES

Aos indivíduos com reconhecida hipersensibilidade às vitaminas do Complexo B.

PRECAUÇÕES

Como ocorre com todos os medicamentos seu uso em pacientes renais crônicos ou em mulheres grávidas deve ser avaliado.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não existem evidências que confirmem a ocorrência de interações relevantes.

REAÇÕES ADVERSAS

Reações alérgicas não são impossíveis de ocorrer quando do uso de vitaminas.

POSOLOGIA

Adultos: 2 a 3 comprimidos pela manhã e à noite, após as refeições.

SUPERDOSAGEM

Ainda não foram descritos sintomas de intoxicação. Em casos de ingestão acidental procure imediatamente um médico. Deve-se agir de acordo com a conduta padrão para os casos de intoxicação.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

Número do lote, data de fabricação e data de validade: Vide cartucho.

Registro no M.S. nº 1.0577.0006.001-3

Farm. Resp.: Dra. Elaine C. M. Pessoa – CRF-SP nº14.059



BUNKER INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA

Rua: Aníbal dos Anjos Carvalho, 212 Cidade Dutra

São Paulo - SP - Fone: (11) 5666-0266

C.N.P.J. 47.100.862/0001-50

Serviço de Atendimento ao Cliente: **SAC 0800.142110**

INDÚSTRIA BRASILEIRA