

Maxibell Colírio

Nitrato de nafazolina

Sulfato de zinco

Descongestionante e adstringente

Uso adulto e pediátrico

(crianças maiores de 2 anos de idade)

Composição por ml

Nitrato de nafazolina 0,5 mg

Sulfato de zinco 4 mg

Veículo estéril q.s.p.1 ml

Conservante: cloreto de benzalcônio 0,01%

Informação técnica

O nitrato de nafazolina é uma amina simpaticomimética de ação direta. Age nos receptores alfa-adrenérgicos das arteríolas da conjuntiva, produzindo vasoconstrição, diminuindo a congestão.

O sulfato de zinco possui ação adstringente e anti-séptica moderada.

O íon zinco precipita/desnatura proteínas e causa vasodilatação moderada sem ação descongestionante. A sua ação adstringente causa clareamento do muco ocular.

Indicações

Nos processos irritativos das estruturas oculares (conjuntivites, blefarites) em que se deseje uma ação anti-séptica e adstringente.

Contra-indicações

Hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Glaucoma de ângulo estreito.

Reações adversas

O uso prolongado pode resultar em midríase e aumento da pressão intra-ocular em pacientes sensíveis.

Posologia

Instilar 1 ou 2 gotas no saco conjuntival, a intervalos determinados por critério médico.

Apresentação

Solução oftálmica estéril - frasco plástico conta-gotas contendo 10 ml

"VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA"

Maxibell (nitrato de nafazolina e sulfato de zinco): Reg. M.S. 1.1725.0025.003-1

Responsável Técnico: Dr. Morio Sato - CRF-SP: nº 0381

Nº de lote, data da fabricação e validade: vide cartucho

Fabricado por:

LATINOFARMA INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS LTDA.

R. Dr. Tomás Sepe, 489 - Cotia – SP

C.N.P.J. nº 60.084.456/0001-09 - Indústria Brasileira

Atendimento ao Consumidor (11) 4702 5322