

METIOLIN COMPOSTO

RACEMETIONINA, CITRATO DE COLINA, BETAÍNA, CIANOCOBALAMINA



FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES

METIOLIN COMPOSTO (racemetonina, citrato de colina, betaína e cianocobalamina) solução oral - embalagens com 12 e 100 flaconetes de 10 mL.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada flaconete (10 mL) contém 100 mg de racemetonina, 500 mg de citrato de colina, 100 mg de betaína e 5 mcg de cianocobalamina.

Excipientes: ciclamato de sódio, sacarina sódica, hidróxido de sódio, ácido clorídrico, asseptoformio M, asseptoformio P, sabor vanilina, sabor caramelo-coco, água deionizada e corante.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Este medicamento deve ser armazenado ao abrigo da luz e calor. O prazo de validade está indicado na embalagem do produto. Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Em alguns casos, os sinais de melhora já são notados no início do tratamento; em outros casos, é necessário um tempo maior para obter-se os efeitos desejados. Não é recomendado o uso deste medicamento no primeiro trimestre da gravidez; se necessário o uso neste período, deverá ser feito sob orientação médica. Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando. Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interromper o trata-

mento sem o conhecimento do seu médico. A interrupção repentina do tratamento com este medicamento não causa efeitos desagradáveis, apenas cessará o efeito terapêutico. Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis. Ocasionalmente pode ocorrer mal-estar do estômago, e, por esta razão, este medicamento não deve ser ingerido com o estômago vazio.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Informe ao seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

A metionina é um aminoácido essencial com importante função hepatoprotetora, pois além de contribuir para a remoção da infiltração gordurosa tem também ação antitóxica acentuada. A colina, um importante componente das membranas celulares, também é essencial na síntese de acetilcolina e atua impedindo a deposição de gordura no tecido hepático.

A principal ação da betaína é prevenir a infil-

tração de gordura no fígado favorecendo o transporte das células gordurosas. A cianocobalamina é essencial para o perfeito metabolismo celular, pois estudos demonstram que ela está envolvida em numerosas reações bioquímicas.

Em animais de laboratório, estas substâncias têm demonstrado ação tanto protetora como curativa das alterações produzidas experimentalmente no fígado, tais como aquelas decorrentes de substâncias tóxicas (arsênio, clorofórmio, tetracloreto de carbono, etc.) e principalmente, da esteatose infiltrativa.

INDICAÇÕES

Medicamento hepatoprotetor.

CONTRA-INDICAÇÕES

PORTADORES DE PATOLOGIAS HEPÁTICAS GRAVES E PACIENTES SENSÍVEIS A QUALQUER COMPONENTE DA FORMULAÇÃO.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

O USO PROLONGADO DA METIONINA EM CRIANÇAS PODE RESULTAR EM GANHO PONDERAL ABAIXO DO NORMAL. PORTANTO, DEVE SER MANTIDO UM ADEQUADO APORTE DE PROTEÍNA DURANTE O USO DESTES MEDICAMENTOS.

O PRODUTO NÃO DEVE SER INGERIDO EM JEJUM POIS OCASIONALMENTE PODEM OCORRER DISTÚRBIOS GÁSTRICOS.

GRAVIDEZ: A SEGURANÇA DO USO DO PRODUTO DURANTE A GRAVIDEZ NÃO FOI

ESTABELECIDA. POR ESTA RAZÃO, NÃO É RECOMENDADA SUA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DA GESTAÇÃO.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

ATÉ O MOMENTO NÃO FORAM RELATADAS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS COM O USO DESTES MEDICAMENTOS.

REAÇÕES ADVERSAS

ESTE PRODUTO APRESENTA UM BAIXO ÍNDICE DE REAÇÕES ADVERSAS; RAROS DISTÚRBIOS GÁSTRICOS COMO NÁUSEA E PIROSE TÊM SIDO RELATADOS. RECOMENDA-SE NÃO INGERIR O PRODUTO COM ESTÔMAGO VAZIO.

POSOLOGIA

Crianças: ½ flaconete (5 mL) até 6 vezes ao dia, ou a critério médico. Pode ser ingerido puro ou diluído em água.

Adultos: 1 flaconete (10 mL) até 6 vezes ao dia, ou a critério médico. Pode ser ingerido puro ou diluído em água.

SUPERDOSAGEM

Devem ser adotadas medidas habituais para remoção do material não absorvido pelo trato digestivo, monitorização clínica e medidas de suporte.

Pacientes Idosos

Este medicamento pode ser utilizado em pacientes acima de 65 anos de idade, desde que observadas as contra-indicações, precauções, interações medicamentosas e reações adversas deste medicamento.

Nº do lote, data de fabricação e prazo de validade: ver cartucho. Ind. Bras. - Reg. MS nº 1.0394.0480
Farm. Resp.: J.G. Rocha CRF/SP nº 4067 - CNPJ 61.150.819/0001-20



FARMASA

LABORATÓRIO AMERICANO DE FARMACOTERAPIA S.A.

RUA NOVA YORK, 245 - 04560-908 - SÃO PAULO - SP - SAC 0800 11 4033 - www.farmasa.com.br