

MODO DE USO ou COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

ASPECTO FÍSICO

MUCOVIT® xarope adulto - Solução xaroposa, adocicada, de cor levemente amarelada.

MUCOVIT® xarope pediátrico - Solução xaroposa, adocicada, de cor laranja.

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

MUCOVIT® xarope adulto tem odor de menta/banana.

MUCOVIT® xarope pediátrico tem odor de menta/banana.

DOSAGEM

ATENÇÃO: Utilizar o copo-medida.

MUCOVIT® xarope adulto

½ copo-medida = 5mL = 30mg - cada mL contém 6mg de cloridrato de ambroxol.

Adultos e adolescentes

½ copo-medida (5mL), 3 vezes ao dia

MUCOVIT® xarope pediátrico

½ copo-medida = 5mL = 15mg - cada mL contém 3mg de cloridrato de ambroxol.

Crianças de 2 a 5 anos

¼ copo-medida (2,5mL), 3 vezes ao dia.

Crianças de 5 a 10 anos

½ copo-medida (5mL), 3 vezes ao dia.

COMO USAR

Não use este medicamento em crianças menores de 2 anos de idade.

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou de seu cirurgião-dentista.

Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação (VIDE CARTUCHO). Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

REAÇÕES ADVERSAS ou QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

MUCOVIT® é geralmente bem tolerado.

Distúrbios gastrintestinais (estômago e intestino):

Pirose (azia), dispepsia (dificuldade de digestão), náusea, vômito, diarreia e outros sintomas gastrintestinais leves.

Distúrbios do sistema imune, distúrbios do tecido subcutâneo e pele:

Exantema, urticária, angioedema, reações anafiláticas (incluindo choque anafilático) e outras reações alérgicas.

CONDUTA EM CASO DE SUPERDOSAGEM ou O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTE MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?

Até o momento desconhecem-se manifestações de intoxicação por superdose de MUCOVIT®. Entretanto, se ocorrerem, consulte o médico.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E USO ou ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Mantenha o medicamento em temperatura ambiente (15°C a 30°C). Proteja da luz.

Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação (VIDE CARTUCHO). Não use medicamento com o prazo de validade vencido.

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Número do lote, data de fabricação e prazo de validade:
VIDE CARTUCHO

MS: 1.0392.0102

Farm. Resp. Dra. Giovana Betttoni - CRF-GO n° 4617

SAC
0800 622929

Vitapan

Indústria Farmacêutica Ltda.
Rua VPR 01 - Quadra 2A
Módulo 01 - DAIA - Anápolis - GO
CNPJ: 30.222.814/0001-31
Indústria Brasileira
www.vitapan.com.br

100787 - 0908A



Mucovit®

cloridrato de ambroxol

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

VIA ORAL

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES

Xarope Adulto: Embalagem contendo frasco de 120mL, acompanhado de copo-medida.

Xarope Pediátrico: Embalagem contendo frasco de 120mL, acompanhado de copo-medida.

COMPOSIÇÕES

Cada 5mL (½ copo medida) de xarope adulto contém:

cloridrato de ambroxol30mg

Veículo q.s.p.....5mL

(ácido cítrico, açúcar, álcool etílico, benzoato de sódio, edetato dissódico, essência de menta e banana, glicerina, metabissulfito de sódio, sorbitol, água deionizada).

Cada 5mL (½ copo medida) de xarope pediátrico contém:

cloridrato de ambroxol15mg

Veículo q.s.p.....5mL

(ácido cítrico, açúcar, álcool etílico, benzoato de sódio, corante amarelo crepúsculo FD&C nº6, edetato dissódico, essência de menta e banana, glicerina, metabissulfito de sódio, sorbitol, água deionizada).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

AÇÃO DO MEDICAMENTO ou COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

MUCOVIT® é um expectorante mucolítico que tem um duplo efeito: favorece a expectoração e alivia a irritação da garganta. Sua composição facilita a eliminação do catarro das vias respiratórias, alivia a tosse, desobstrui os brônquios e, devido ao leve efeito anestésico local, alivia a irritação da garganta associada a tosse com catarro.

Os efeitos iniciam-se logo nos primeiros dias de tratamento.

INDICAÇÕES DO MEDICAMENTO ou POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

MUCOVIT® serve para facilitar a expectoração (soltar do peito) quando houver acúmulo de catarro (secreção) em doenças broncopulmonares (brônquios e pulmões) agudas e crônicas.

RISCOS DO MEDICAMENTO ou QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Contra-indicações

Você não deve usar MUCOVIT® se tiver sensibilidade (alergia) ao ambroxol e a outros componentes da fórmula.

Este medicamento é contra-indicado na faixa etária de 0 - 2 anos.

ADVERTÊNCIAS

Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.

ATENÇÃO DIABÉTICOS: CONTÉM AÇÚCAR.

PRECAUÇÕES

MUCOVIT® contém sorbitol. Se você tem uma rara intolerância hereditária à frutose, não deve usar este medicamento.

Se aparecerem novas lesões na pele ou nas mucosas, você deve procurar o médico imediatamente e parar de utilizar o medicamento por precaução.

Gravidez e lactação

Estudos em animais e a ampla experiência em pessoas com o uso do produto após a 28ª semana não evidenciaram efeitos prejudiciais durante a gravidez.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

O uso de MUCOVIT® juntamente com os antibióticos amoxicilina, cefuroxima, eritromicina e doxicilina produz concentrações antibióticas mais elevadas no tecido pulmonar.

Desconhecem-se interações prejudiciais de importância clínica com outras medicações.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.