

MURICALM[®]

pimetixeno

Formas farmacêuticas e apresentações

Solução oral (gotas) frasco com 10 mL

Xarope..... frasco com 120 mL

USO PEDIÁTRICO (CRIANÇAS ACIMA DE 1 ANO DE IDADE)**Composição**

Cada 1 mL da solução oral (30 gotas) contém 1 mg de pimetixeno.

Excipientes: ácido acético, glicerol, álcool etílico e água purificada.

Cada 5 mL do xarope (1 colher de chá) contém 0,5 mg de pimetixeno.

Excipientes: ácido acético, álcool etílico, aroma cítrico, aroma de groselha, metilparabeno, propilparabeno, sacarose e água purificada.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Ação esperada do medicamento: MURICALM é utilizado no tratamento de bronquite, tosse asmática, rinite, conjuntivite, todas de origem alérgica.

Cuidados de armazenamento: O xarope e a solução oral devem ser conservados em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).

Prazo de validade: A data de validade está impressa no cartucho. Não utilize o produto após a data de validade.

Gravidez e lactação: Informe ao seu médico sobre a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao seu médico se está amamentando.

Cuidados de administração: Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Interrupção do tratamento: Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Reações adversas: Informe ao seu médico sobre o aparecimento de reações desagradáveis. A mais comum é sonolência.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Ingestão concomitante com outras substâncias: Informe ao seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

Contra-indicações e precauções: MURICALM não deve ser administrado a crianças com menos de 1 ano de idade.

Para MURICALM xarope, por favor, considerar a seguinte observação:

Atenção diabéticos: contém açúcar.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Propriedades

Como anti-histamínico pluripotente, o pimetixeno exerce efeito inibitório sobre várias aminas biogênicas e outras substâncias mediadoras endógenas, que se acredita estarem envolvidas na patogênese da broncoconstrição alérgica, formas asmáticas da tosse e outras afecções alérgicas. Demonstrou-se que o pimetixeno inibe as ações da histamina, serotonina, acetilcolina e bradicinina. Possui também propriedades sedativas acentuadas que podem ser benéficas no tratamento de crianças com distúrbios alérgicos acompanhados de um estado de hiperexcitabilidade.

Indicações

Bronquite espástica e tosse asmática de origem alérgica; rinite alérgica, conjuntivite, prurido; estados de excitação associados com essas afecções.

Contra-indicações

Hipersensibilidade ao pimetixeno ou a outros agentes anti-histamínicos.

MURICALM não deve ser administrado a crianças com menos de 1 ano de idade.

Precauções e advertências

MURICALM pode causar sedação, prejudicando portanto as reações do paciente; esse fator deve ser considerado quando a criança é exposta ao trânsito. Em pacientes diabéticos deve-se considerar o conteúdo de açúcar do xarope (0,55 g/mL).

Para MURICALM xarope, por favor, considerar a seguinte observação:

Atenção diabéticos: contém açúcar.

Interações medicamentosas

MURICALM pode potencializar os efeitos dos sedativos, hipnóticos ou anti-histamínicos.

Reações adversas

Sonolência; ocasionalmente excitação; raramente boca seca ou tontura.

Posologia

Recomenda-se o seguinte esquema posológico:

Solução oral (gotas):

A partir de 1 ano de idade:

1 gota por quilograma de peso corporal, 3 vezes ao dia.

Xarope:

Entre 1 e 5 anos de idade: 5 a 7,5 mL, 3 vezes ao dia.

Entre 5 e 10 anos de idade: 7,5 a 10 mL, 3 vezes ao dia.

Acima de 10 anos de idade: 10 a 15 mL, 3 vezes ao dia.

Superdose

Relatou-se que a superdose aguda causa sedação ou excitação.

Podem também ocorrer efeitos anticolinérgicos, como boca seca, midríase ou taquicardia.

Tratamento: lavagem gástrica, administração de carvão ativado e terapia sintomática.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Reg. MS - 1.0068.0057

Farm. Resp.: Marco A. J. Siqueira - CRF-SP 23.873

Lote, data de fabricação e de validade: vide cartucho

Fabricado por:

Novartis Biociências S.A.

Av. Ibirama, 518 - Complexos 441/3 - Taboão da Serra - SP

CNPJ: 56.994.502/0098-62 - Indústria Brasileira

® = Marca registrada de Novartis AG, Basileia, Suíça

BDI 26/07/90 + MS

