

Muscuprina

cloridrato de ciclobenzaprina

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES

Comprimidos revestidos de 10 mg. Embalagem contendo 15 e 30 comprimidos revestidos.

USO ADULTO

USO ORAL

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido revestido contém

cloridrato de ciclobenzaprina 10 mg

excipiente q.s.p* 1com rev

* lactose, celulose microcristalina, croscarmelose sódica, fosfato de cálcio tribásico, estearato de magnésio, hipromelose + macrogol, dióxido de titânio, óxido de ferro amarelo.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Ação do medicamento: Muscuprina é um relaxante muscular, usado no tratamento

de espasmos musculares associados com dor aguda e de origem músculo-esquelética.

Cuidados de armazenamento

Manter à temperatura ambiente (15°C e 30°C). Proteger da luz e manter em lugar seco.

Prazo de validade

O número de lote e as datas de fabricação e validade estão impressos no cartucho do medicamento. Não use medicamento com o prazo de validade vencido.

Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

Gravidez e Lactação

A segurança de **Muscuprina** durante a gravidez e a amamentação ainda não foi estabelecida. Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento

ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Cuidados de administração

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. O tratamento com Muscuprina por períodos superiores a duas ou três semanas deve ser feito com o devido acompanhamento médico.

Muscuprina não deve ser administrado em crianças abaixo de 15 anos.

Interrupção do tratamento

Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Reações Adversas

Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis. As reações mais comuns são sonolência, tonturas enjôos e visão borrosa. Pode ocorrer secura da boca. Para aliviar a sensação, utilizar chicles ou caramelos sem açúcar, gelo ou substitutos de saliva. Consulte o dentista se a boca se mantiver seca por mais de 2 semanas.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Ingestão concomitante com outras substâncias

Durante o tratamento evite ingerir bebidas alcoólicas. Não utilize outros medicamentos depressores do Sistema Nervoso Central enquanto estiver tomando **Muscuprina**. Não se auto medique e siga rigorosamente as instruções do seu médico.

Contra-indicações e Precauções

Informe ao seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.

Outras reações, relatadas aos compostos tricíclicos, embora não relacionadas a ciclobenzaprina, devem ser consideradas pelo médico.

Não foram relatadas reações referentes à dependência, com sintomas decorrentes da

interrupção do tratamento. A interrupção do tratamento após administração prolongada

pode provocar náuseas, cefaléia, mal-estar.

POSOLOGIA

Adultos

A dose usual é de 20 a 40 mg ao dia, em duas a quatro administrações.

A dose máxima diária é de 60 mg. O uso do produto por períodos superiores a duas ou três semanas, deve ser feita com o devido acompanhamento médico.

SUPERDOSAGEM

Conduta em caso de superdosagem: Altas doses de ciclobenzaprina podem causar confusão temporária, distúrbios na concentração, alucinação visual, agitação,

reflexos hiperativos, rigidez matinal, vômitos ou hiperpirexia, bem como qualquer outra reação descrita em "Reações Adversas".

A DL 50 da ciclobenzaprina é aproximadamente 338 a 425 mg/Kg em camundongos

e ratos, respectivamente.

O tratamento é sintomático e de suporte. Deve ser provocado, o mais cedo possível,

o esvaziamento gástrico por emese, seguido de lavagem gástrica. Após pode ser administrado carvão ativado nas doses de 20 a 40 mg a cada 4 a 6 horas, durante 24 a 48 horas após a ingestão de ciclobenzaprina. A diálise não é eficaz para retirar a ciclobenzaprina do organismo.

Deve ser feito um ECG e controlada a função cardíaca nos casos de evidência de qualquer sinal de arritmia.

Os sinais vitais devem ser cuidadosamente monitorados, bem como o equilíbrio hidroeletrólítico. Nos casos de efeitos antimuscarínicos severos ou risco para vida do paciente, administrar salicilato de fisostigmina (1 a 3 mg IV).

Para arritmias cardíacas administrar doses apropriadas de neostigmina, piridostigmina

ou propranolol.

Nos casos de insuficiência cardíaca, deve ser considerada a administração de um preparado digitálico de ação curta.

Recomenda-se um estrito controle da função cardíaca, pelo menos durante cinco dias.

PACIENTES IDOSOS

Não se dispõe de informações. Os pacientes idosos manifestam sensibilidade aumentada a outros antimuscarínicos e é mais provável que experimentem reações adversas aos antidepressivos tricíclicos relacionados estruturalmente com a ciclobenzaprina do que os adultos jovens.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Reg. MS: nº 1.3569.0541

Farm.Resp.: Dr. Adriano Pinheiro Coelho

CRF - SP nº 22.883

Fabricado e comercializado por: **EMS S/A**

Rod. Jornalista F. A. Proença, km 08

Bairro Chácara Assay - CEP: 13186-901 - Hortolândia/SP

“Lote, Fabricação e Validade: vide cartucho”.