

NATALINS® FÓLICO
polivitamínico e polimineral
Comprimidos revestidos

USO ORAL

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO:

Comprimidos revestidos. **NATALINS® FÓLICO** é apresentado em embalagens com 30 comprimidos revestidos.

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO:

Cada comprimido revestido de Natalins® fólico contém:		Gestantes	Lactantes**
	Quantidade	% da IDR*	% da IDR*
Retinol ¹ (Vitamina A)	1200 mcg	150%	141%
Colecalciferol (Vitamina D3)	10 mcg	200%	200%
Ácido Ascórbico (Vitamina C)	65,00 mg	118%	93%
Tiamina ² (Vitamina B1)	1,50 mg	107%	100%
Riboflavina (Vitamina B2)	1,70 mg	121%	106%
Niacina (Vitamina B3)	20,00 mg	111%	118%
Piridoxina ³ (Vitamina B6)	2,00 mg	105%	100%
Ácido Pantotênico ⁴	9,25 mg	154%	132%
Ácido Fólico	400 mcg	113%	136%
Cianocobalamina (Vitamina B12)	6,00 mcg	231%	214%
Cálcio ⁵	250,0 mg	21%	25%
Ferro ⁶	40,0 mg	148%	267%
Iodo ⁷	150 mcg	75%	75%
Cobre ⁸	1000 mcg	100%	77%
Manganês ⁹	1,00 mg	50%	38%

* IDR=Ingestão Diária Recomendada

** lactantes = mães amamentando

Sob a forma de: ¹ acetato de retinol, ² mononitrato de tiamina, ³ cloridrato de piridoxina, ⁴ pantotenato de cálcio, ⁵ carbonato de cálcio, ⁶ fumarato ferroso, ⁷ iodeto de potássio, ⁸ sulfato cúprico, ⁹ óxido de manganês.

Excipientes: Óxido de magnésio, lactose, polivinilpirrolidona, crospovidona, ácido esteárico, estearato de magnésio, hidroxipropilmetilcelulose, corante FD&C amarelo n°6 laca de alumínio, polietilenoglicol, dióxido de titânio, corante FD&C vermelho 40 laca de alumínio e polissorbato 80.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Ação esperada do medicamento – NATALINS® FÓLICO é um suplemento vitamínico e mineral na gestação e aleitamento, em dietas restritivas e inadequadas.

Cuidados de armazenamento - A conservação do medicamento deve ser feita à temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), evitando-se calor excessivo. Proteger da umidade e da luz.

MATRIZ:

Rua Carlos Gomes, 924 – Santo Amaro – São Paulo – SP – CEP 04743-903

Telefone: (011) 3882-2174 – Fax: (011) 38822014 – CNPJ 56.998.982/0001-07

Prazo de validade - vide cartucho. **Este medicamento não deverá ser utilizado caso o prazo de validade do produto esteja vencido.**

Gravidez e lactação - "Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término". "Informar ao médico se está amamentando".

Cuidados de administração – NATALINS® FÓLICO deve ser ingerido com um pouco de água, leite ou suco de frutas. "Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento".

Interrupção do tratamento - "Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico".

Reações adversas - Não são conhecidas reações adversas relacionadas ao uso de **NATALINS® FÓLICO** na dose recomendada. "Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis".

"TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS"

Ingestão concomitante com outras substâncias - Não são conhecidas interações com medicamentos ou outras substâncias que prejudiquem a utilização do produto.

Contra-indicações e Precauções: "Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento". ANEMIA PERNICIOSA DEVE SER EXCLUÍDA ANTES DO USO DESTE PRODUTO UMA VEZ QUE O ÁCIDO FÓLICO PODE MASCARAR OS SINTOMAS DESSA DOENÇA.

"NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE".

ATENÇÃO: SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS:

A gravidez representa um período de grande esforço fisiológico, com exigências nutricionais aumentadas. O metabolismo é acelerado, visto que, deve ser feita uma provisão para o crescimento tanto do corpo da mulher quanto do feto. NATALINS® FÓLICO Polivitamínico e Polimineral foi formulado para uso durante a gravidez e amamentação. Além das vitaminas essenciais (retinol, coлекаliferol, ácido ascórbico, tiamina, riboflavina, nicotinamida, piridoxina, ácido pantotênico e cianocobalamina), NATALINS® FÓLICO contém ferro e cálcio, bem como pequenas quantidades de outros elementos, quais sejam, o iodo, o cobre e o manganês. A presença de ácido fólico na formulação, previne o aparecimento de anemia do tipo macrocítica durante a gestação e lactação. Especialmente no 3º trimestre da gestação, a necessidade de ácido fólico pelo feto é muito grande. Ao nascer, a concentração plasmática de ácido fólico do feto é cinco vezes maior do que a da mãe, no mesmo momento. Como consequência, pode ocorrer carência materna do ácido fólico bem como sua consequência clínica que é anemia megaloblástica.

INDICAÇÕES:

A indicação principal de NATALINS® FÓLICO é um suplemento vitamínico e mineral na gestação e aleitamento, em dietas restritivas e inadequadas.

CONTRA-INDICAÇÕES:

NATALINS® FÓLICO está contra-indicado nos casos de anemia perniciosa, uma vez que o ácido fólico pode mascarar seus sintomas.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:

ANEMIA PERNICIOSA DEVE SER EXCLUÍDA ANTES DO USO DESTE PRODUTO UMA VEZ QUE O ÁCIDO FÓLICO PODE MASCARAR SEUS SINTOMAS.

MATRIZ:

Rua Carlos Gomes, 924 – Santo Amaro – São Paulo – SP – CEP 04743-903

Telefone: (011) 3882-2174 – Fax: (011) 38822014 – CNPJ 56.998.982/0001-07

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS/INGESTÃO CONCOMITANTE COM OUTRAS SUBSTÂNCIAS:

Não são conhecidas interações medicamentosas e outras interações decorrentes da utilização do produto.

REAÇÕES ADVERSAS/COLATERAIS E ALTERAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS:

Não são conhecidas reações adversas na dose recomendada.

POSOLOGIA:

1 comprimido por dia, ou a critério médico.

SUPERDOSAGEM:

Em caso de superdosagem acidental, deve-se consultar o médico imediatamente.

PACIENTES IDOSOS:

Não há recomendações especiais para pacientes idosos.

“SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.”

nº do lote, data de validade e fabricação : vide cartucho.

Reg, MS - 1.0180.0124

Farm. Bioq. Resp.: Dr. Osvaldo Orellana Sanchez – CRF-SP nº 8251

BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA LTDA.

Rua Carlos Gomes, 924 – Santo Amaro – São Paulo - SP

CNPJ 56.998.982/0001-07 - Indústria Brasileira

® Marca Registrada

SAC Bristol –Myers Squibb

0800 727 6160

sac.brz@bms.com

www.bristol.com.br

www.meadjohnson.com.br

MATRIZ:

Rua Carlos Gomes, 924 – Santo Amaro – São Paulo – SP – CEP 04743-903

Telefone: (011) 3882-2174 – Fax: (011) 38822014 – CNPJ 56.998.982/0001-07