

NATRILIX (*Servier*).

Indapamida

Composição

Cada drágea contém: Indapamida 2,5 mg. Excipientes (amido de milho, carboximetilcelulose sódica, cera branca, etilcelulose, goma-arábica, lactose, laca *coccina*, estearato de magnésio, monooleato de glicerol, polissorbato, polividona excipiente, sílica coloidal, açúcar branco oficional, talco, dióxido de titânio) q.s.p. 1 drágea de 125 mg.

Indicações

Hipertensão arterial essencial com ou sem comprometimentos cardíaco, ocular, renal e cerebral.

Contra-indicações

Acidentes vasculares cerebrais recentes. Insuficiências hepática e renal graves. Associação com vincamina ou sais de lítio.

Reações adversas

São raras e de pouca gravidade. Foram assinaladas astenia, hipotensão ortostática. A uricemia pode se elevar ligeiramente, mas não provocou acesso gotoso nos pacientes até então incólumes. As hipocalemias foram assinaladas nos pacientes particularmente expostos a esse tipo de acidente.

Posologia

Via oral: Uma drágea ao dia em todos os casos de hipertensão. A dose eficaz anti-hipertensiva é de uma drágea ao dia. Nessa posologia, o efeito farmacológico diurético do produto não tem, habitualmente, tradução clínica. Nas posologias superiores, a ação anti-hipertensiva não aumentou, enquanto o efeito diurético se amplificou. Essas doses superiores não deverão ser utilizadas.

Apresentação

Caixas com 15 e 30 drágeas com 2,5 mg de indapamida.

SERVIER

laboratórios servier do brasil ltda.

MATRIZ:

22775-113 - Rio de Janeiro-RJ
Estrada dos Bandeirantes, 4211 - Curicica - Jacarepaguá
Tel.. 0XX(21) 2142-1414
Fax. 0XX(21) 2142-1415
SAC..... 0800-7033431