

NEOVERMIN

mebendazol
tiabendazol

FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES

Comprimidos: Embalagens com 6, 12 e 480* comprimidos.

Suspensão Oral: Embalagens contendo 1 e 50* frasco com 30 mL.

*Embalagem Hospitalar

USO ADULTO E PEDIÁTRICO (Crianças acima de 5 anos)

USO ORAL

COMPOSIÇÕES

Cada comprimido contém:

mebendazol.....	100mg
tiabendazol.....	166mg
excipientes q.s.p.....	1 comprimido

(amido de milho, polivinilpirrolidona, sacarina sódica, celulose microcristalina, croscarmellose sódica e estearato de magnésio).

Cada 5mL de suspensão oral contém:

mebendazol.....	100mg
tiabendazol.....	166mg
veículo q.s.p.....	5mL

(carboximetilcelulose, silicato de alumínio e magnésio, metilparabeno, propilparabeno, sacarina sódica, ciclamato de sódio, álcool etílico 96° GL, sorbitol, ácido benzóico, silicone anti-espumante, essência de tutti-frutti e água purificada).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

- Neovermin® tem ação antiparasitária.
- Conservar em temperatura ambiente (15° a 30°C). Proteger da luz e umidade.
- Prazo de validade: **VIDE CARTUCHO**. Não use medicamento com o prazo de validade vencido; poderá ocorrer diminuição significativa do seu efeito terapêutico.
- "Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término". "Informe seu médico se está amamentando". Neovermin® é contra-indicado para mulheres grávidas ou em fase de amamentação.
- "Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento".
- Os comprimidos podem ser mastigados e engolidos com água.
- "Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico".
- "Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis, tais como: cansaço, dores de cabeça, tonturas ou problemas de visão".

- "TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS".

- Não administrar Neovermin® juntamente com: cimetidina, teofilina e derivados da xantina.

- O uso em crianças menores de 5 anos deve ser feito somente a critério médico.

- Contra-indicado para pacientes hipersensíveis a quaisquer dos componentes da fórmula. Gravidez e lactação.

- "Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando antes do início ou durante o tratamento".

- "NÃO TOME MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE".

INFORMAÇÕES PARA PROFISSIONAL DE SAÚDE

Neovermin® possui em sua composição, mebendazol e tiabendazol, dois anti-helmínticos com ação específica sobre diversos nematódeos e alguns cestódeos. A associação dos dois componentes ativos permite o tratamento de verminoses múltiplas com um só medicamento. O mebendazol, é absorvido pelo trato gastrointestinal, e atinge o pico plasmático entre 40 e 50 minutos após administração oral; após administração de 100 mg, 2 vezes ao dia durante 3 dias consecutivos produz níveis plasmáticos em torno de 0,03 mcg/mL; cerca de 2% da dose administrada é excretada na urina e o restante é excretado nas fezes, inalterado ou na forma de metabólito primário (2-amino). Seu mecanismo de ação se deve ao fato de inibir a formação dos microtúbulos citoplasmáticos dos vermes, causando diminuição da captação de glicose e dos estoques de glicogênio que são fontes de energia para o verme.

O tiabendazol, é rapidamente absorvido pelo trato gastrointestinal e atinge o pico plasmático cerca de 1 a 2 horas após administração oral; é quase completamente metabolizado a 5-hidroxi e aparece na urina na forma de conjugados; dentro de 48 horas após a administração pode ser recuperada 5% da dose nas fezes e 90% na urina. Seu mecanismo de ação ainda não está bem definido, mas admite-se que atua inibindo o sistema enzimático fumarato-redutase do microrganismo, interferindo na sua fonte de energia.

INDICAÇÕES - Neovermin® está indicado para o tratamento das infestações causadas pelos seguintes microrganismos: Enterobius vermiculares, Trichuris trichiura, Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale e Ancylostoma brasiliensis, Necator americanus, Strongyloides stercoralis, Trichinella spirallis (larva migrans cutânea e muscular), Taenia solium e Taenia saginata, Echinococcus granulosus e Mutilocularis e Dracunculus sp.

CONTRA-INDICAÇÕES - Neovermin® ESTÁ CONTRA-INDICADO PARA MULHERES GRÁVIDAS OU EM FASE DE LACTAÇÃO, E PARA PACIENTES COM HIPERSENSIBILIDADE A QUAISQUER DOS COMPONENTES DA FÓRMULA.

PRECAUÇÕES - Neovermin® deve ser administrado com cautela em pacientes portadores de insuficiência renal e/ou hepática. De acordo com a literatura científica, não existem estudos concluídos que assegurem o uso de Neovermin® em crianças menores de 5 anos, portanto, recomenda-se nestes casos uma criteriosa avaliação médica da relação risco/benefício antes da prescrição.

Alguns pacientes podem apresentar leucopenia e hiperglicemia transitória.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS - O uso concomitante de Neovermin® com cimetidina provoca um aumento da concentração plasmática de mebendazol.

Devido a presença do tiabendazol na fórmula de Neovermin®, o seu uso concomitante com teofilina potencializa os efeitos desta.

Quando for administrar Neovermin® em pacientes que fazem uso de medicamentos derivados da xantina é necessário um prévio monitoramento sanguíneo para ajuste da posologia.

O uso concomitante entre mebendazol e metronidazol deve ser evitado, pois resultados obtidos em estudos de caso de controle sugerem uma possível relação com a Síndrome de Stevens Johnson / necrólise epidérmica tóxica.

REAÇÕES ADVERSAS - As reações adversas mais comuns são dores abdominais, náuseas, vômitos e diarreia. Existem alguns relatos de um pequeno número de pacientes que apresentaram fadiga, dor de cabeça, bradicardia, vertigem, hipotensão e hiperglicemia durante o uso de medicamentos contendo tiabendazol.

POSOLOGIA

- | | |
|-------------------------------|--|
| * Suspensão Oral: | - Crianças menores de 5 anos: a critério médico. |
| | - Crianças de 5 a 10 anos: 5 mL, 2 vezes ao dia durante 3 dias. |
| * Comprimidos: | - Crianças de 5 a 10 anos: 1 comprimido, 2 vezes ao dia durante 3 dias. |
| | - Crianças de 11 a 15 anos: 1 comprimido, 3 vezes ao dia durante 3 dias. |
| * Infestações por cestódeos: | - Adultos: 2 comprimidos por vez, 2 vezes ao dia durante 3 dias. |
| * Infestações por nematódeos: | - Adultos: 1 comprimido por vez, 2 vezes ao dia durante 3 dias. |

SUPERDOSE - Nestes casos recomenda-se lavagem gástrica e orientação médica.

COMO EVITAR A VERMINOSE

1. Beba somente água filtrada ou fervida.
2. Lave cuidadosamente as frutas e verduras e cozinhe bem os alimentos.
3. Coma apenas carne bem passada.
4. Ande sempre com os pés calçados.
5. Lave as mãos antes das refeições e após usar os sanitários.

6. Conserve sempre as unhas cortadas e limpas.
7. Mantenha as instalações sanitárias em boas condições de higiene.
8. Siga corretamente estes conselhos, evitando que os vermes atinjam toda a família.

PACIENTES IDOSOS - O uso em pacientes idosos (acima de 60 anos) requer prescrição e acompanhamento médico.

DIZERES LEGAIS

Registro M.S. nº 1.0465.0020

Farm. Resp.: Dr. Marco Aurélio Limirio G. Filho - CRF-GO nº 3.524

Nº do lote, prazo de validade e data de fabricação: **VIDE CARTUCHO**

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Prezado Cliente:

Você acaba de receber um produto Neo Química.

Em caso de alguma dúvida quanto ao produto, lote, data de fabricação,
ligue para nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor.

Laboratório Neo Química Com. e Ind. Ltda.

VPR 1 - Quadra 2-A - Módulo 4 - DAIA - Anápolis - GO - CEP 75132-020

www.neoquimica.com.br

C.N.P.J.: 29.785.870/0001-03 - Indústria Brasileira

SAC 0800-9799900