



- Toalhas e lençóis, assim como roupas íntima, devem ser mudados diariamente e lavados com detergente.
Enquanto persistir a infecção, existe a possibilidade de propagação a outras pessoas.

SUPERDOSAGEM

Com o uso correto do medicamento não há casos de superdosagem e não existem relatos de efeitos tóxicos graves.

Pacientes Idosos: Não existem advertências ou recomendações especiais sobre o uso do produto por pacientes idosos, desde que respeitada as condições gerais do paciente e as precauções do produto.

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.

Reg. MS nº 1.0577.0070

Número do lote, data de fabricação e validade: vide cartucho

Farm. Resp.: Dr. Marcelo Ramos - CRF-SP nº 16.440

Bunker Indústria Farmacêutica Ltda.

Rua Aníbal dos Anjos Carvalho, 212

Cidade Dutra - São Paulo - SP

C.N.P.J. 47.100.862/0001-50 - Indústria Brasileira



BK03012

Nidazolín **BUNKER** nistatina

FORMA FARMACÊUTICA, VIA DE ADMINISTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO

Creme vaginal: embalagem contendo bisnaga de 40 g.

USO INTRAVAGINAL

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada g de creme vaginal contém:

nistatina 25.000 UI
excipiente q.s.p. 1 g
(cloreto de benzalcônio, ureia, propilenoglicol, edetato de sódio, álcool cetosteárilico, petrolato líquido, polissorbato 60, glicerol, acetato de cetila, álcool de lanolina acetilado, fenoxietanol, metilparabeno, butilparabeno, etilparabeno, propilparabeno, edetato dissódico e água).

INFORMAÇÃO AO PACIENTE

AÇÃO ESPERADA DO MEDICAMENTO

NIDAZOLIN é um antifúngico destinado ao tratamento de infecções causadas por fungos sensíveis a nistatina, tais como *Candida albicans* (monília) e outros da mesma espécie.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

O produto deve ser conservado à temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).

PRAZO DE VALIDADE

O prazo de validade é de 24 meses a contar de sua fabricação. O prazo de validade está indicado na embalagem do produto. **Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento, sendo que, após este prazo o produto pode ser prejudicial ou perder seu efeito terapêutico.**

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO

Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após seu término, seu uso durante a gravidez deve ser avaliado pelo médico.

Informe seu médico se estiver amamentando.



CUIDADOS DE ADMINISTRAÇÃO

Observe as instruções (modo de usar) antes de começar o tratamento.

Siga orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

REAÇÕES ADVERSAS

Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis ou reação de hipersensibilidade ao produto.

INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. Seu uso deve ser continuado por 48 horas após o desaparecimento dos sintomas ou após a normalização das culturas.

Mantenha o tratamento mesmo durante o período menstrual.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

CONTRAINDICAÇÃO E PRECAUÇÕES

NIDAZOLIN é contraindicado em pacientes com história de hipersensibilidade a droga.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO; PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

A nistatina é um antibiótico antifúngico com atividade fungistática e fungicida “in vitro” contra uma grande variedade de fungos. Age pela ligação aos esteroides da membrana celular dos fungos resultando na mudança de permeabilidade da membrana, seguida de vazamento dos componentes intracelulares. A nistatina não é absorvida através da pele e das mucosas íntegras.

INDICAÇÕES

NIDAZOLIN creme vaginal é indicado para o tratamento de candidíase vaginal (monilíase).

CONTRAINDICAÇÕES

A nistatina está contraindicada em pacientes com história de hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

PRECAUÇÕES

O uso de nistatina deverá ser descontinuado se aparecer qualquer reação de hipersensibilidade.

Gravidez: Até o momento não há dados sobre o uso do produto em mulheres grávidas. As preparações intravaginais de nistatina

devem ser prescritas pelo médico que avaliará os riscos envolvidos no uso.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Pelo fato de ser um fármaco que não é absorvido pela mucosa vaginal, não apresenta interações com outros fármacos.

REAÇÕES ADVERSAS

A nistatina é virtualmente um produto não tóxico e não sensibilizante, sendo bem tolerado em todos os grupos de idade, mesmo em tratamento prolongado.

POSOLOGIA

Uma aplicação diária do creme vaginal durante o período prescrito pelo seu médico. Nos casos mais graves até 2 aplicações diárias. As aplicações não deverão ser interrompidas durante o período de menstruação. O uso concomitante de forma oral e vaginal é aconselhável para evitar recidiva.

MODO DE USAR

Após remoção da tampa do tubo, adaptar o aplicador à sua extremidade e puxar o êmbolo até o fim do curso. Apertar suavemente a base do tubo, forçando a entrada do creme no aplicador até completo enchimento. Após a introdução do aplicador na vagina, empurrar lentamente o êmbolo com o dedo indicador até o final de seu curso, depositando assim todo creme na vagina. Após a aplicação lavar o aplicador com água corrente morna, não havendo necessidade de ser esterilizado. Para a limpeza do aplicador não usar água fervendo. Durante a gestação deve-se tomar precaução no sentido de evitar pressão excessiva do aplicador contra o colo uterino.

PRECAUÇÕES HIGIÊNICAS

A fim de afastar a possibilidade de reinfecção, deve-se observar rigorosa higiene pessoal. As mãos devem ser cuidadosamente lavadas antes de se aplicar o medicamento. Além das medidas higiênicas habituais, as seguintes precauções são de grande vantagem para prevenir reinfecção:

- Após cada micção, enxugar a vulva, sem friccionar o papel higiênico.

- A fim de evitar uma possível propagação de germes do reto ao trato genital, após defecação, cuidar que o material possivelmente infectado não entre em contato com a genitália.

