

Nikkho-vac®

Antígenos mistos

Uso adulto e pediátrico

Forma farmacêutica e apresentação - *Solução oral (gotas)*: Embalagem contendo frasco com 15 ml.

Composição - Cada ml contém: Proteínas de substâncias inaláveis 2,50 mcg; Proteínas de substâncias alimentares 7,50 mcg; Antígenos de bactérias das vias respiratórias (em proteínas, correspondentes a 5 bilhões de germes) 8,00 mcg; Veículo (cloreto de sódio, glicerina, timerosal e água) q.s.p. 1 ml.

Informações ao paciente - NIKKHO-VAC® destina-se ao tratamento dessensibilizante das alergias alimentares, respiratórias e cutâneas e como imunoestimulante. NIKKHO-VAC® deve ser guardado na sua embalagem original, ao abrigo do calor excessivo, umidade e luz solar direta. Nestas condições, este medicamento possui prazo de validade a partir da data de fabricação (ver embalagem externa). Este, como qualquer outro produto, não deve ser usado após vencido o prazo de validade ou caso suas características físicas estejam alteradas. Ao comprar um medicamento, verifique se a embalagem está íntegra. NIKKHO-VAC®, assim como qualquer outro medicamento, não deve ser utilizado durante a gravidez e a amamentação, a não ser sob estrita orientação médica. Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez ou se está amamentando na vigência do tratamento ou após o seu término. Para que o tratamento com NIKKHO-VAC® forneça os resultados esperados, siga a orientação do seu médico, respeitando sempre o modo de usar, os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. Não desaparecendo os sintomas, retorne ao seu médico. Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis. Não há restrições quanto à alimentação ou outra medicação que necessite ser utilizada junto com NIKKHO-VAC®. Mesmo assim, informe ao seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento. *Medidas recomendadas para que o paciente alérgico não seja prejudicado durante o tratamento dessensibilizante com NIKKHO-VAC®*: 1. Evitar o uso de quadros, cortinas, tapetes e móveis estofados de tecidos, que constituem depósitos de poeira. 2. Evitar o contato com animais domésticos cujos pelos e penas são reservatórios de alérgenos. 3. Manter a residência, principalmente o dormitório, bem ventilada, limpa e seca. Usar um desumidificador ou uma lâmpada acesa embaixo ou próxima à cama, para evitar o excesso de umidade. 4. Evitar ceras, inseticidas, espirais contra insetos, tintas, perfumes e desodorantes domiciliares. 5. Todos os travesseiros e colchões do dormitório do paciente alérgico deverão ser de espuma de borracha ou revestidos com plástico. 6. Não usar roupas de lã ou felpudas. Dar preferência a tecidos de algodão e linho. 7. Evitar o manuseio de vassouras, espanadores, livros e guardados antigos empoeirados e mofados. 8. Praticar esportes (natação) ou fazer exercícios respiratórios ao ar livre.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Não tome remédio sem o conhecimento de seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

Informações técnicas - NIKKHO-VAC® é um dessensibilizante oral à base de antígenos proteicos mistos, extraídos de alimentos, de substâncias inaláveis e de microrganismos das vias respiratórias. É uma preparação original, uma vez que utiliza a via sublingual, evitando os inconvenientes da via parenteral. Os antígenos proteicos do produto não sofrem destruição em presença das enzimas salivares e são bem absorvidos. A dessensibilização é obtida, administrando-se doses apropriadas dos extratos antigênicos, resultando em uma maior tolerância ou criando um estado de refratariedade do organismo, quando em contato com agentes alérgicos.

Indicações - NIKKHO-VAC® está indicado para o tratamento dessensibilizante das alergias resultantes da exposição aos fungos do ar, à poeira, aos alimentos e aos germes das vias respiratórias.

Contraindicações - NIKKHO-VAC® está contraindicado em pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Precauções e advertências - Durante a gravidez e a lactação, o produto deve ser utilizado sob estrita orientação médica. Como qualquer outro medicamento, não se recomenda a sua utilização no primeiro trimestre da gravidez.

Interações medicamentosas - Até o momento, não foram observadas interações com outros medicamentos.

Reações adversas - Raramente podem ocorrer reações de hipersensibilidade. Dependendo do grau de intensidade dessa reação, deve-se reduzir a dose ou, até mesmo, suspender o seu uso.

Posologia e modo de usar - *Adultos*: Seis gotas, duas vezes ao dia, por via sublingual. *Crianças até 10 anos*: Metade da dose de adultos, a critério médico. Para maior absorção e melhor efeito, conservar a medicação na boca por alguns minutos, antes de engolir. A terapêutica deve ser mantida até a dessensibilização e depois espaçada, progressivamente, a cada três dias, a cada sete dias e assim sucessivamente, de acordo com o médico.

Superdosagem - Até o momento, não existem relatos de casos de superdosagem.

Pacientes idosos - Não há advertências ou recomendações especiais sobre o uso do produto em pacientes idosos.

Venda Sob Prescrição Médica.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800-2829911 e (9-021-21) 3393-4266.

Registro no M.S. 1.0014.0048.

Química e Farmacêutica NIKKHO do Brasil Ltda.