



sulfato de polimixina B - sulfato de neomicina acetato de fludrocortisona - cloridrado de lidocaína

SOLUÇÃO OTOLÓGICA

Forma Farmacêutica e Apresentação:

Solução otológica: frasco contendo 8 mL com conta-gotas.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO USO OTOLÓGICO

Composição:

Cada 28 gotas (1mL) contém:

sulfato de neomicina..... 10,0 mg
(equivalente a 7,5 mg de neomicina base)
acetato de fludrocortisona..... 1,0 mg
sulfato de polimixina B..... 10.000 UI
cloridrado de lidocaína..... 40,0 mg
Excipientes: cloreto de benzalcônio, propilenoglicol,
glicerina, ácido clorídrico e água purificada..... q.s.p. 1 mL

Informação ao Paciente:

PANOTIL® é uma solução para uso otológico composta de dois agentes antibióticos com adição de um corticosteróide e um anestésico local, indicado no tratamento das otalgias de várias origens e otite externa e média de diversas causas. PANOTIL® destina-se ao tratamento de diversos tipos de otite. Siga as orientações do seu médico, pois, em alguns casos, PANOTIL® é tratamento coadjuvante e o uso de antibiótico e/ou outras drogas faz-se necessário. O medicamento deve ser guardado, antes e após a abertura da embalagem em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C). A validade do produto é de 24 meses, a partir da data de fabricação. Observar a data de fabricação e o prazo de validade impressos no rótulo e no cartucho. NÃO USE MEDICAMENTO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO.

INFORME SEU MÉDICO O APARECIMENTO DE REAÇÕES DESAGRADÁVEIS QUE POSSAM OCORRER COM O USO DO MEDICAMENTO. INFORME SEU MÉDICO A OCORRÊNCIA DE GRAVIDEZ NA VIGÊNCIA DO TRATAMENTO OU APÓS O SEU TÉRMINO. INFORMAR AO MÉDICO SE ESTIVER AMAMENTANDO. INFORME SEU MÉDICO SOBRE QUALQUER MEDICAMENTO QUE ESTEJA USANDO, ANTES DO INÍCIO OU DURANTE O TRATAMENTO. SIGA A ORIENTAÇÃO DO SEU MÉDICO, RESPEITANDO SEMPRE OS HORÁRIOS, AS DOSES E A DURAÇÃO DO TRATAMENTO. NÃO INTERROMPER O TRATAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DE SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.

Informação Técnica:

PANOTIL® é composto de dois agentes antibacterianos de amplo espectro, com a adição de um corticosteróide e um anestésico local.

A polimixina B e a neomicina possuem ação contra microorganismos Gram-positivos e Gram-negativos, inclusive *Proteus* e *Pseudomonas*. A associação age sobre os germes mais comumente responsáveis pelas várias formas de infecções otológicas, prevenindo a impetiginização de formas eczematosas, o

desenvolvimento de infecções secundárias e o desenvolvimento de resistência bacteriana. Por outro lado, a polimixina B apresenta também ação antimicótica, evitando superinfecções micóticas.

A fludrocortisona é um corticosteróide de uso otológico cuja inclusão na fórmula do produto deve-se à sua ação antiinflamatória.

A lidocaína é um anestésico local. Tem a finalidade de aliviar a dor, sintoma frequente nas otites.

A peculiar viscosidade do veículo fornece a permanência do medicamento *in situ* e facilita a absorção dos princípios ativos. O pH ácido (aproximadamente 5) inibe o desenvolvimento de *Pseudomonas* e micetos.

Indicações:

Otitis externas agudas e crônicas, otites médias exsudativas e crônicas, furunculose do conduto auricular, dermatoses alérgicas do tipo exsudativo seborréico e eczematoso do conduto e do pavilhão auriculares.

Processos supurativos após intervenções cirúrgicas na orelha e na mastóide. Otalgias de várias origens.

Contra-indicações:

PANOTIL® é contra indicado nas pessoas que apresentam hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Precauções e advertências:


PANOTIL® destina-se exclusivamente ao uso otológico para administração em gotas no conduto auricular.

Interações medicamentosas:

Até o presente momento não foram assinaladas interações medicamentosas.

Reações adversas:

Dermatoses em pacientes sensíveis aos componentes da fórmula.



Posologia e modo de usar:

Instilar 3 a 5 gotas de PANOTIL® no conduto auricular, 2 a 4 vezes ao dia, ou a critério médico. Um algodão impregnado com o medicamento pode ser introduzido no canal auditivo após a aplicação.

O tempo do tratamento varia conforme a rapidez da resposta terapêutica e da etiologia da afecção.

A elevada tolerabilidade do preparo permite, se necessário, tratamentos prolongados.

Superdosagem:

O medicamento utilizado corretamente para uso otológico não apresenta problemas de superdosagem. O excesso pode ser eliminado instilando-se água morna no conduto auditivo. Se, por engano, o medicamento for ingerido, deve ser efetuada lavagem gástrica. No caso que tenha transcorrido mais tempo desde a ingestão, consultar imediatamente o médico, que poderá instaurar um tratamento sintomático levando em conta os efeitos farmacológicos do produto.

Pacientes idosos:

Deve-se seguir as orientações gerais descritas na bula. Contudo, o tratamento deve ser iniciado com a dose mínima.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Nº lote, data de fabricação e validade: vide rótulo e cartucho

MS 1.0084.0102

Farm. Resp.: Dr. Helcio Garcia de Souza CRF-SP 37.345

Fabricado por:



ZAMBON LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Rua Descampado, 63 - Vila Vera

CEP: 04296-090 - São Paulo - SP

CNPJ: 61.100.004/0001-36

Indústria Brasileira

® Marca Registrada



www.zambon.com.br

606410

Zambon Group - Desenvolvimento de Embalagem		
Produto: PANOTIL	Código: 606410	Prof. 7
Cores: BLACK	Dim: 115 x 125 mm	Data: 17 OUT 2007
Outros:		
Checked by: Iraci	Comentários:	
Aprovado por:		
Nome: _____ Assinatura: _____ Data: ____/____/____		