

Pilocan 2% e 4% Colírio

Cloridrato de pilocarpina

Antiglaucomatoso miótico

Uso adulto e pediátrico

Composição por ml

Pilocan 2%

Cloridrato de pilocarpina 20 mg

Veículo estéril q.s.p. 1 ml

Composição por ml

Pilocan 4%

Cloridrato de pilocarpina 40 mg

Veículo estéril q.s.p. 1 ml

Conservante: Cloreto de benzalcônio 0,01%

Informação técnica

A pilocarpina é um parassimpatomimético com ação colinérgica direta sobre os receptores muscarínicos da musculatura lisa da íris e glândulas de secreção.

Provoca miose através da contração do esfíncter da íris. A contração do músculo ciliar aparentemente abre os espaços intertrabeculares e facilita o efluxo do humor aquoso.

No glaucoma de ângulo fechado a constrição pupilar aparentemente traciona a íris, distanciando-a das trabéculas, aliviando o bloqueio da malha trabecular.

Indicações

Como miótico, no controle da pressão intra-ocular elevada (glaucoma).

Pilocan (pilocarpina) pode ser usado em combinação com outros mióticos, betabloqueadores, inibidores da anidrase carbônica e agentes simpatomiméticos ou hiperosmóticos.

Contra-indicações

Irites. Hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Glaucoma por bloqueio pupilar.

Reações adversas

Espasmo ciliar, irritação ocular, congestão conjuntival, cefaléia e indução de miopia. Redução da acuidade visual sob iluminação deficiente. O uso prolongado pode causar opacificação do cristalino.

Posologia

Exclusivamente para uso tópico. A concentração e a frequência diária de instilações necessárias para manter o controle da pressão intra-ocular serão estabelecidas a critério médico.

Início de ação rápido, com aparecimento de miose em 10 a 30 minutos e persistente por 4 a 8 horas.

A redução máxima da pressão intra-ocular ocorre em até 75 minutos após a instilação do colírio, persistindo por 4 a 14 horas.

Apresentação

Solução oftálmica estéril (colóide) - frasco plástico conta-gotas contendo 10 ml

"VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA"

Pilocan (pilocarpina): Reg. M.S. 1.1725.0019.003-7 = apresentação de 2% e Reg. M.S. 1.1725.0019.004-5 = apresentação de 4%.

Responsável Técnico: Dr. Morio Sato - CRF-SP: nº 0381

Nº de lote, data da fabricação e validade: vide cartucho

Fabricado por:

LATINOFARMA INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS LTDA.

R. Dr. Tomás Sepe, 489 - Cotia – SP

C.N.P.J. nº 60.084.456/0001-09 - Indústria Brasileira

Atendimento ao Consumidor (11) 4702 5322