



PACIENTES IDOSOS

Não foram realizados estudos apropriados sobre os efeitos da permetrina a 1% (10 mg/mL ou 10 mg/g) na população geriátrica. No entanto, não foram relatados problemas relacionados com o uso do produto em pacientes idosos.

**Siga corretamente o modo de usar,
não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**

® Marca Registrada

Reg. MS nº 1.0577.0046

Nº do lote, data de fabricação e validade: vide cartucho.

Farm. Resp.: Dr. Marcelo Ramos - CRF-SP nº 16.440

Registrado por:

Bunker Indústria Farmacêutica Ltda.

Rua Aníbal dos Anjos Carvalho, 212

São Paulo - SP

C.N.P.J. 47.100.862/0001-50

Indústria Brasileira

Fabricado por:

Indústria e Comércio Zambon Bernardi Ltda.

Rua Toledo Barbosa, 666-690

São Paulo - SP



PIODREX®



permetrina

FORMA FARMACÊUTICA, VIA DE ADMINISTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO

Sabonete: embalagem contendo um sabonete com 100 g.

USO TÓPICO

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada grama do sabonete contém:

permetrina	10 mg
excipiente q.s.p.	1 g
(dióxido de titânio, ácido etidrônico, essência de erva doce, edetato sódico, sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerol e cloreto de sódio).	

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

PIODREX® deve ser mantido em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Prazo de validade 36 meses, a partir da data de fabricação.

**NÃO USE MEDICAMENTO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO.
PODE SER PREJUDICIAL PARA A SUA SAÚDE.**

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informar ao médico se está amamentando.

CUIDADOS DE ADMINISTRAÇÃO

PIODREX®: massagear energicamente a região afetada com PIODREX® durante três minutos, deixando permanecer a espuma por dez minutos, enxaguando em seguida. Para evitar a reinfestação, seguir as seguintes normas de higiene:

- Artigos pessoais como lençóis, chapéus, roupa de cama e outros devem ser lavados com água bem quente, lavados a seco ou conservados em uma bolsa plástica bem fechada, por aproximadamente duas semanas; pentes e escovas devem ser lavados em água bem quente por cinco a dez minutos.
- Manter as unhas e os cabelos curtos e limpos.

BK03099





- Evitar o exagero no ato de se coçar e colocar luvas de proteção nas crianças.
- Procurar descobrir possíveis portadores para evitar possível contato com eles ou seus objetos de uso.
- Alertar responsáveis por instituições coletivas frequentadas pelo portador do parasita.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis, como queimação, prurido, dormência, vermelhidão, erupções cutâneas, sensação de picada, inchaço e formigamento.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

PIODREX® é contraindicado a pessoas hipersensíveis à permetrina ou a qualquer componente da fórmula. Pessoas sensíveis a outros piretroides sintéticos ou a piretrinas podem desenvolver sensibilidade ao PIODREX®. O produto não é indicado na presença de inflamação aguda do couro cabeludo.

PIODREX® não deve entrar em contato com os olhos, membranas mucosas (narinas, boca, etc.), feridas ou queimaduras. Se entrar em contato com os olhos acidentalmente, lavar abundantemente com água. Havendo irritação, suspenda o uso e procure orientação médica. Não ingerir.

Não deve ser utilizado na gravidez ou no período da amamentação, a não ser que seja sob prescrição médica.

A segurança e a eficácia do PIODREX® não foram estabelecidas em crianças menores de dois meses.

Em caso de infestação das sobrancelhas ou cílios, procurar orientação médica.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PIODREX® encerra como princípio ativo a permetrina, uma mistura de isômeros cis e trans de um piretroides sintético. A permetrina atua na membrana da célula nervosa do parasita, desregulando o canal de sódio, através do qual é regulada a polarização da membrana. A repolarização retardada e a paralisia do parasita são as consequências de sua ação.

Dados preliminares indicam que menos de 2% da quantidade aplicada é absorvida sistemicamente. A permetrina apresenta

certa atividade residual por, aproximadamente, 14 dias. Sofre biotransformação rápida por reações de hidrólise, e a excreção principal é a renal.

INDICAÇÃO

PIODREX® está indicado como adjuvante no tratamento da pediculose.

CONTRAINDICAÇÕES

PIODREX® é contraindicado a pacientes com conhecida hipersensibilidade à permetrina ou que sejam sensíveis a outros piretroides sintéticos ou a piretrinas. Não é indicado também na presença de inflamação aguda do couro cabeludo.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Não existem estudos bem controlados em mulheres grávidas ou lactantes. Desta forma, deve ser avaliada a relação risco-benefício, quando a permetrina for utilizada nestas condições.

A permetrina 1% (10 mg/mL ou 10 mg/g) é segura e eficaz em crianças com dois meses de idade ou mais. A segurança e eficácia em crianças mais novas ainda não foram estabelecidas.

Algumas manifestações como o prurido, o eritema e o inchaço são provenientes da pediculose e estas podem se agravar temporariamente com o uso da permetrina.

REAÇÕES ADVERSAS

Algumas reações adversas pouco frequentes ou raras foram relatadas, como queimação, prurido, dormência, eritema, exantema, sensação de picada, inchaço e formigamento com o uso de produtos à base de permetrina.

POSOLOGIA

Uso tópico.

PIODREX®: massagear energicamente a região afetada com PIODREX® durante três minutos, deixando permanecer a espuma por dez minutos, enxaguando em seguida.

SUPERDOSAGEM

Não há relatos de ingestão de produtos à base de permetrina. Se ocorrer, podem ser adotadas medidas gerais de suporte e lavagem gástrica.

