



PROSTEM PLUS®

Pygeum africanum
Urtica dioica

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Caixa contendo 12 cápsulas gelatinosas moles, em blister.

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada cápsula contém:

<i>Pygeum africanum</i>	25 mg
<i>Urtica dioica</i>	300 mg
Excipientes: óleo de soja, ácido sórbico, lecitina de soja, q.s.p.....	1 cápsula.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Ação esperada do medicamento

Alívio dos sintomas decorrentes da hiperplasia prostática benigna.

Cuidados de armazenamento

Mantém a embalagem fechada. Conservar em temperatura ambiente (15°C a 30°C), protegido da luz e umidade.

O PRODUTO SE CONSERVA FORA DAS CONDIÇÕES INDEBIDAS, PODE APRESENTAR ALTERAÇÃO NO SEU ASPECTO.

Prazo de validade

Desde que sejam observados os cuidados de armazenamento o produto apresenta prazo de validade de 24 meses.

A data de expiração está impressa na embalagem.

O PRODUTO NÃO DEVE SER UTILIZADO FORA DO PRAZO DE VALIDADE INDICADO SOB RISCO DE NÃO PRODUZIR OS EFEITOS ESPERADOS.

Cuidados de administração

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Interrupção do tratamento

Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Reações adversas

Informar seu médico o aparecimento de reações desagradáveis, tais como: intolerância gástrica e reações alérgicas cutâneas, as quais ocorrem raramente e normalmente desaparecem com a ingestão do produto às refeições. **PROSTEM plus** é geralmente bem tolerado.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Ingestão concomitante com outras substâncias

Não são conhecidas quaisquer restrições ao uso de **PROSTEM plus** com alimentos.

Contra-indicações e precauções

Informar seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento. **PROSTEM plus** é contra-indicado para pacientes com hipersensibilidade ao produto.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

PROSTEM plus é um preparado combinado, destinado a reduzir os distúrbios causados pela hiperplasia benigna da próstata, suprimindo os problemas miccionais e aumentando o estímulo de esvaziamento da bexiga.

PROSTEM plus combina a ação já comprovada de dois extratos vegetais, o *Pygeum africanum* e a *Urtica dioica*.

O *Pygeum africanum*, segundo estudos recentes *in vitro* (M. Paubert e Braquet, The Pharmacologist, 1993 e François Yablonsky, Journal of Urology, 1997), exerce um efeito inibidor da proliferação de fibroblastos, induzida por alguns fatores de crescimento (bFGF e EGF), hoje considerados como importantes no desenvolvimento da HPB, o que indica responder em parte pelos seus efeitos benéficos no alívio dos sintomas decorrentes dessa patologia, bem como pela regeneração do epitélio glandular. Em outro estudo, M. Paubert demonstrou também a ação anti-inflamatória do *Pygeum africanum* no tecido prostático.

A *Urtica dioica* tem a propriedade de ligar-se à globulina transportadora de androgênios, o que resulta na diminuição dos níveis plasmáticos de SHBG, globulina responsável pelo transporte de testosterona às células prostáticas.

A ação conjunta destas duas substâncias restabelece a funcionalidade prostática vesical e alivia os sintomas dos distúrbios miccionais decorrentes da HPB, como a polaciúria, disúria, nictúria, dificuldade para início da micção, jato urinário fraco e resíduo vesical pós miccional, além de outros.

INDICAÇÕES

Tratamento dos transtornos funcionais causados pela hiperplasia benigna da próstata (hipertrofia prostática), que se manifesta por: polaciúria, disúria e resíduo vesical pós-miccional.

CONTRA-INDICAÇÕES

PROSTEM plus é contra-indicado para pacientes com hipersensibilidade ao produto.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Não há restrições ao uso de **PROSTEM plus** em pacientes diabéticos. A melhora funcional e sintomática obtida com o uso do produto não exclui o acompanhamento médico ao paciente, no que se refere ao controle do volume do adenoma e do resíduo pós-miccional. Procure orientação médica quando houver dúvidas.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não são conhecidas até o presente momento.

REAÇÕES ADVERSAS

Podem ocorrer, raramente, intolerância gástrica e reações alérgicas cutâneas, que normalmente desaparecem com a ingestão do produto às refeições.

POSOLOGIA

Uma cápsula de **PROSTEM plus** 2 vezes ao dia, durante 2 meses, repetindo este esquema a cada 4 ou 6 meses, ou a critério médico.

SUPERDOSAGEM

Na eventualidade de superdosagem, recomenda-se adotar as medidas habituais.

PACIENTES IDOSOS

PROSTEM plus pode ser usado por pessoas acima de 65 anos de idade, desde que observadas as precauções do produto.

Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE:
Vide cartucho.

Registro M.S. nº 1.0146.0035
Farm. Resp.: Dra. Maria Isilda Neves Torres - CRF-SP 14.820

Produzido por:
Cardinal Health Brasil 402 Ltda.

Embalado por:



LABORATÓRIOS BALDACCIS S.A.
Rua Pedro de Toledo, 520 - VI. Clementino - São Paulo - SP
CNPJ 61.150.447/0001-31 - Indústria Brasileira

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

lbaldacci@baldacci.com.br
t 0800-133 222



