

HERTZ®

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO Cápsula: Frasco de vidro com 20 cápsulas.

USO ORAL

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Ritmoneuran é um produto fitoterápico indicado em casos de stress, angústia, ansiedade leve a moderada e tensão.

Cuidados de conservação: proteger da luz e umi-

Ritmoneuran é válido por 36 meses, a partir da data de fabricação indicada na embalagem. Não utilizar o produto se o prazo de validade estiver vencido.

Informe ao médico a ocorrência de gravidez após o início ou durante a vigência do tratamento, bem como o aparecimento de reações desagradáveis. Não utilizar durante a gravidez e lactação.

Informe ao seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.

Diabéticos:

Cápsulas: não contém açúcar.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PRO-CURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

ESTE MEDICAMENTO NÃO PODE SER PARTIDO OU MASTIGADO.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ritmoneuran contém alcalóides e flavonóides que revelam diversas propriedades farmacológicas como: depressores do sistema nervoso central, bloqueio neuro muscular, relaxamento dos músculos lisos e sedativo nervoso de valor nas neurastenias, neuroses devido a excessos de trabalho, perturbação nervosa da menopausa, histeria, insônia.

INDICAÇÕES

Medicação indicada como tranquilizante em casos de stress, angústia, ansiedade leve a moderada e tensão.

CONTRA-INDICAÇÕES

Pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula, gravidez e lactação.

PRECAUÇÕES

Não administrar durante a gravidez ou amamentação, exceto sob prescrição médica.

Deve-se evitar dirigir veículos ou operar máquinas perigosas após a administração devido a possibilidade de modificar as reações do paciente.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Deve-se evitar o uso concomitante de álcool e outros medicamentos de ação central, como tranquilizantes e antidepressivos, pois o efeito pode ser intensificado.

Pode haver potencialização dos medicamentos inibidores da MAO (monoamino-oxidase).

REAÇÕES ADVERSAS

Até o momento não foram verificadas reações adversas com o produto.

POSOLOGIA

Adultos e crianças acima de 12 anos: 1 a 2 cápsulas 3 vezes ao dia.

SUPERDOSAGEM

Em caso de ingestão acidental de dose muito acima das preconizadas, promover esvaziamento gástrico através de indução de emese ou lavagem gástrica. Recomenda-se adotar as medidas habituais de controle das funções vitais.

PACIENTES IDOSOS

A sensibilidade de pacientes idosos pode ser alterada pela idade. Recomenda-se o uso sob prescricão médica.

PRODUTO EM ESTUDO PARA AVALIAÇÃO CIENTÍFICA DAS INDICAÇÕES TERAPÊUTI-CAS E DA TOXICIDADE. O USO DESTE PRODUTO ESTÁ BASEADO EM INDICAÇÕES TRADICIONAIS

Data de fabricação, data de vencimento e lote Vide cartucho.



SAC 0800 7049001 www.kleyhertz.com.br

KLEY HERTZ S.A. - Indústria e Comércio R. Comendador Azevedo, 224 - P. Alegre - RS Farmacêutica Resp.: Paula Carniel Antonio CRF-RS 4228 - Reg. M.S. 1.0689.0038.004-6 C. N. P. J. nº 92.695.691/0001-03 INDÚSTRIA BRASILEIRA

200605