

Sanilin[®]
cloreto de cetilpiridínio 1,466mg
benzocaina 10mg
HERTZ[®]

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Pastilha: tubo plástico com 12 pastilhas.
Sabores cereja, laranja e menta.

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada pastilha contém:
Cloreto de cetilpiridínio 1,466 mg
Benzocaina 10,000 mg
Excipiente q.s.p. 1 pastilha
(Excipiente: amido, carbonato de cálcio, estearato de magnésio, aroma, corante, lactose, mentol, sacarina sódica, sacarose, silicato de magnésio, povidona e água deionizada).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

AÇÃO DO MEDICAMENTO

Sanilin é um medicamento utilizado para o alívio das dores e irritações da boca e da garganta. Auxilia no tratamento das afecções da mucosa orofaríngea, tosse e rouquidão.

RISCOS DO MEDICAMENTO

Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis como reações de hipersensibilidade, dermatites e metemoglobinemia (em crianças). O produto é contra indicado para pacientes hipersensíveis aos componentes da fórmula. Pacientes idosos: a sensibilidade dos pacientes idosos pode ser alterada com a idade por isso recomenda-se o uso sob prescrição médica. Atenção diabéticos: contém açúcar.

MODO DE USAR

Para adultos e crianças maiores de 6 anos: dissol-

ver lentamente na boca, sem mastigar, sempre que necessário, não ultrapassando 6 pastilhas por dia, ou segundo critério médico.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

NÃO USE O MEDICAMENTO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ANTES DE USAR OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO.

REAÇÕES ADVERSAS

Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis, tais como reações alérgicas. Este produto é geralmente bem tolerado nas doses recomendadas. Tem sido relatados raros casos de reações alérgicas e inflamação das mucosas.

CONDUTA EM CASO DE SUPERDOSAGEM

Não foram relatados casos de superdosagem. Se a dor de garganta persistir por mais de 2 dias, procure orientação médica.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Conservar o produto em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C) e proteger da luz e umidade. O prazo de validade é de 24 meses, a partir da data de fabricação indicada na embalagem.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

O Cloreto de cetilpiridínio possui propriedades antisépticas. Detém ou inibe o crescimento dos microorganismos presentes, com notável poder de penetrabilidade nos tecidos atingidos pelos estados infecciosos.

A benzocaina é um anestésico local utilizado no alívio da dor de mucosas e pele. Sua ação resulta de sua capacidade de deprimir os impulsos oriundos de nervos aferentes da pele, superfícies de mucosa e músculos do Sistema Nervoso Central. A absorção é mínima. O início do efeito começa em 1 minuto e a duração do efeito é de 15 a 20 minutos (na mucosa).

290506

INDICAÇÕES

Para o alívio rápido e temporário das dores e irritações da boca e da garganta provocadas por faringites, amigdalites, estomatites, resfriados e por procedimentos odontológicos e pequenas cirurgias da boca e garganta.

CONTRA-INDICAÇÕES

O produto é contra indicado para pacientes hipersensíveis aos componentes da fórmula, durante a gravidez e lactação.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

USO ORAL

Adultos e crianças maiores de 6 anos: dissolver lentamente na boca, sem mastigar, sempre que necessário, não ultrapassando 6 pastilhas por dia, ou segundo critério médico.

Atenção: este medicamento é um similar que passou por testes e estudos que comprovam a sua eficácia, qualidade e segurança, conforme legislação vigente.

ADVERTÊNCIAS

Não engolir as pastilhas e sim, chupá-las, lentamente, a fim de permanecer o maior tempo possível em contato com a garganta inflamada. O efeito anestésico é desejável e esperado, devendo persistir por tempo determinado. O produto é contra indicado para pacientes hipersensíveis aos componentes da fórmula. Pacientes idosos: a sensibilidade dos pacientes idosos pode ser alterada com a idade. Por isso recomenda-se o uso sob prescrição médica. Atenção diabéticos: contém açúcar. A não ser por indicação médica, o produto não deve ser administrado à crianças com menos de 6 anos de idade. Se a dor da boca ou da garganta for grave, persistir por mais de 2 dias, acompanhada de febre, dor de cabeça, náusea ou vômito, procure orientação médica. Este produto deve ser usado com cuidado se a mucosa estiver muito traumatizada.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Anestésicos locais como a benzocaina, interagindo com Procabazina, provocam efeitos hipertensivos, sendo recomendado não administrar simultaneamente. Anestésicos locais interagindo com piridostigmina ocasionam diminuição do efeito da piridostigmina

em pacientes com miastenia gravis. Logo, deve-se evitar administração conjunta. Se isso não for possível, fazê-lo com extrema cautela. Reajustar (aumentar) a dose de neostigmina, se necessário. Anestésicos locais interagem com colinérgicos de ação indireta, interferindo no efeito colinérgico em pacientes miastênicos. Portanto, deve-se administrar com precaução, aumentando a dose em pacientes miastênicos. As gorduras presentes no leite e ovos antagonizam os efeitos do cloreto de cetilpiridínio.

REAÇÕES ADVERSAS

ALTERAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS

O mentol pode causar reação de hipersensibilidade. Não deve ser utilizado antes de exames laboratoriais.

SUPERDOSAGEM

Em caso de ingestão acidental de dose acima das preconizadas, promover o esvaziamento gástrico através de indução de emese ou lavagem gástrica. Recomenda-se adotar as medidas habituais de controle das funções vitais.

PACIENTES IDOSOS

A sensibilidade dos pacientes idosos pode ser alterada com a idade. Por isso recomenda-se o uso sob prescrição médica.

Data de fabricação, data de vencimento e lote vide cartucho.



SAC 0800 7049001
www.kleyhertz.com.br

KLEY HERTZ S.A. Indústria e Comércio

Rua Com. Azevedo, 224 - Porto Alegre - RS
Farm. Resp.: Paula Camiel Antonio - CRF-RS 4228
Sanilin Cereja - Reg. no M.S. 1.0689.0151.002-1
Sanilin Laranja - Reg. no M.S. 1.0689.0151.003-8
Sanilin Menta - Reg. no M.S. 1.0689.0151.001-1
C. N. P. J. nº 92.695.691/0001-03
INDÚSTRIA BRASILEIRA

120106