



ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conserve o produto na embalagem original e à temperatura ambiente (entre 15 e 30°C) e protegido da luz e umidade.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

® Marca Registrada

Reg. MS nº 1.0440.0159

Número do lote, data de fabricação e validade: vide cartucho

Farm. Resp.: Dra. Lauren Lobo Lustosa - CRF-SP nº 27.944

Instituto Terapêutico Delta Ltda.

Estrada do Capovilla, 129

Distrito Industrial - Indaiatuba - SP

C.N.P.J. 33.173.097/0002-74

Indústria Brasileira



Santóss[®]

carbocisteína



FORMAS FARMACÊUTICAS, VIA DE ADMINISTRAÇÃO E APRESENTAÇÕES

Xarope adulto: embalagem contendo um frasco com 100 mL.

Xarope pediátrico: embalagem contendo um frasco com 100 mL.

Solução oral (gotas): embalagem contendo um frasco com 20 mL.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

USO ORAL

COMPOSIÇÃO

Cada mL de xarope adulto contém:

carbocisteína 50 mg
veículo q.s.p. 1 mL
(metilparabeno, corante caramelo, essência de caramelo, hidróxido de sódio, sacarose e água).

Cada mL de xarope pediátrico contém:

carbocisteína 20 mg
veículo q.s.p. 1 mL
(metilparabeno, corante vermelho eritrosina, essência de tutti frutti, hidróxido de sódio, sacarose e água).

Cada mL de solução oral (gotas) contém:

carbocisteína 50 mg
veículo q.s.p. 1 mL
(benzoato de sódio, ácido cítrico, corante vermelho ponceau, essência de morango, hidróxido de sódio, sacarose e água).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

SANTÓSS[®] ajuda a diminuir a produção das secreções respiratórias, assim como deixa as secreções menos espessas, facilitando sua eliminação pelo organismo, quando há um excesso dessas secreções por doenças respiratórias.

SANTÓSS[®] começa a fazer efeito cerca de 1 a 2 horas após a sua administração.

DE11331



POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

SANTÓSS® ajuda no tratamento de problemas respiratórios, quando há um excesso de secreções que podem piorar o estado do paciente.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

CONTRAINDICAÇÕES

O produto não deve ser utilizado por pacientes com úlceras no estômago ou no duodeno ou hipersensibilidade aos componentes da formulação.

ADVERTÊNCIAS

O tratamento com SANTÓSS® não substitui o tratamento específico das doenças respiratórias, como a bronquite, a asma ou as infecções dos pulmões. Assim, antes de começar o tratamento com SANTÓSS®, o médico deve ser consultado para diagnosticar o tipo de doença e indicar o tratamento ou medicamento específico para cada doença.

ATENÇÃO DIABÉTICOS: SANTÓSS® Xarope adulto, Xarope Pediátrico e Solução Oral (Gotas) contém açúcar.

PRECAUÇÕES

- Gravidez e lactação: este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.
- Pacientes idosos: não existem restrições ou precauções especiais com relação ao uso do produto por pacientes idosos.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

- Ingestão juntamente com outras substâncias: durante o tratamento com SANTÓSS®, não fazer uso de medicamentos antitussígenos e atropínicos.

ESTE MEDICAMENTO É CONTRAINDICADO NA FAIXA ETÁRIA INFERIOR A 2 ANOS DE IDADE.

INFORME AO MÉDICO OU CIRURGIÃO DENTISTA O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS.

INFORME AO SEU MÉDICO OU AO CIRURGIÃO-DENTISTA SE VOCÊ ESTÁ FAZENDO USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO.

NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

- Aspecto físico e organoléptico do produto:

SANTÓSS® xarope adulto é límpido e translúcido, de aspecto homogêneo, com cor e odor de caramelo.

SANTÓSS® xarope pediátrico é límpido e translúcido, de cor vermelha, homogêneo e com odor de tutti frutti.

SANTÓSS® gotas é uma solução límpida e translúcida, de cor vermelha, homogênea e com odor de morango.

POSOLOGIA

- **Xarope Adulto:** 5 a 10 mL (para medir o volume, utilize o copo medida) de SANTÓSS® Xarope Adulto 3 vezes ao dia.

- **Xarope Pediátrico:** Crianças entre 5 e 12 anos de idade: 5 a 10 mL (para medir o volume utilize o copo medida) de SANTÓSS® Xarope Pediátrico 3 vezes ao dia.

- **Solução Oral (Gotas):** Crianças entre 2 e 5 anos de idade: 2 gotas/Kg/ Peso de SANTÓSS® Solução Oral (Gotas Pediátricas), 3 vezes ao dia.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE SEU CIRURGIÃO-DENTISTA.

NÃO USE O MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ANTES DE USAR OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO.

QUAIS OS MALES QUE ESSE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Ocasionalmente, este medicamento pode causar algumas reações desagradáveis como: dor no estômago, enjoo, diarreia, sangramento no estômago ou intestinos, alergia na pele, tontura, insônia, dor de cabeça, palpitação e leve diminuição da taxa de açúcar no sangue. Informe seu médico o aparecimento destas ou de quaisquer outras reações desagradáveis.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTE MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?

Nestes casos, os sintomas mais comuns que podem aparecer são dor de estômago, enjoo, vômito e diarreia. O médico deve ser imediatamente comunicado e, provavelmente deverá ser feita uma lavagem gástrica, devendo o paciente ser mantido sob cuidados médicos.

